

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5/
/10164 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Δ/νσεις Γεωργίας και Εμπορίου

Πληροφορίες: Ν. Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο: 5291413

Εδρες τους

2. Πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο Ιχνοστοιχείο
γεωργικό φάρμακο SEQUESTRENE

CIBA - GEIGY ΕΛΛΑΣ
ΑΒΕΕ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο

15300 - ΑΝΘΩΤΕΔ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 "Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων".
2. Τη γνωμοδότηση του ΔΣΥΓΕΦ στη 2η συνεδρίασή του στις 14-3-88, θέμα 9γ.
3. Τις αριθμ. 344172/7-5-86 (ΦΕΚ 318/Β/9-5-86) και 260347/16-2-87 (ΦΕΚ 83/Β/16-2-87) κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημ. Πιτσιώρη και Κων. Τσιγαρίδα".
4. Τη σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α'. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο Ιχνοστοιχείο γεωργικό φάρμακο SEQUESTRENE με τα παρακάτω στοιχεία:

Παρασκευαστής: CIBA GEIGY - Ελβετία

Τυποποιήτης - συσκευαστής: Θα δηλώνεται στην υπηρεσία κάθε φορά που διαφέρει από τον παρασκευαστή.

Αντιπρόσωπος: CIBA GEIGY ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Εμπορικό όνομα: SEQUESTRENE

Εγγυημένη σύνθεση: Χηλικός σίδηρος περιεκτικότητας 6% σε μεταλλικό σίδηρο.

Μορφή: S.G (Υδατοδιαλυτοί κόκκοι)

Αριθμός εγκρίσεως: 10048

Καθαρότητα TECHNICAL από το οποίο θα παρασκευάζεται: Χηλικός σίδηρος

100%

Εγκρίνονται οι παρακάτω οδηγίες χρήσης:

Συνιστάται για τη θεραπεία τροφοπενιών σιδήρου.

Οι δόσεις εξαρτώνται από το μέγεθος και την ανάπτυξη των φυτών, την ένταση της χλωρώσης και τη σύσταση του εδάφους. Οι μεγάλες δόσεις είναι για πολύ αναπτυγμένα φυτά, για χλωρώσεις (κιτρινίσματα) βαριάς μορφής και για βαριά αδιαπέραστα εδάφη.

Οι μικρές δόσεις για μικρά φυτά, χλωρώσεις ελαφριάς μορφής ή για προληπτικές εφαρμογές και για πολύ διαπερατά εδάφη, που απαιτούν πολλά ποτίσματα. Σ' αυτά τα εδάφη συστήνεται αντί μιας εφαρμογής, να γίνονται 3 ή και 4 διαδοχικές εφαρμογές μέσα στη χρονιά συνδυασμένες με τα ποτίσματα.

Λιπέλια: 5 γρ./φυτό κατά τη ρύτωση ή 20-50 γρ./πρέμνο με περίπου 10 κιλά νερό.

Οπωροφόρα:

Πυρηνόκαρπα: Ιδίως Ροδακινιές - Βερυκοκιές: 50-150 γρ. ανά δέντρο με 10-15 κιλά νερό.

Μηλοειδή: Ιδίως αχλαδιές αλλά και Μηλιές: 100-300 γρ. ανά δέντρο με 10-15 κιλά νερό.

Εσπεριδοειδή: Μικρά: 50-100 γρ./δέντρο

Μέτρια: 100-150 γρ. /δέντρο

Μεγάλα: 150-250 γρ./δέντρο

Η εφαρμογή γίνεται με 10-25 λίτρα νερού και άμεση ενσωμάτωση.

Φυτώρια δένδρων: γενικά 5-8 γρ./δεντρύλιο με 10-25 λίτρα νερού και άμεση ενσωμάτωση.

Καλλωπιστικά - Ανθοκομικά:

Σε γλάστρες (Γαρδένια, Χρυσάνθεμο, Μπιγόνια κ.ά.). Σε ήδη υγρό χώμα ρίζε διάλυση Σεκεστρέν: 1 γρ./κιλό νερό. Στην Ορτανσία 5 γρ./κιλό νερό. Σε βαριά προσβολή επανάλαβε μετά 8 μέρες.

Σε τριανταφυλλιές: 3-5 γρ./φυτό ή 10-20 γρ./μ², καθολικά.

Σε καλλωπιστικούς θάμνους: (αζαλέες, ροδόδεντρα, ορτανσίες):
10-20 γρ./φυτό, με το νερό ποτίσματος.

Σε καλλωπιστικά δέντρα: 50-100 γρ./φυτό ομοίως.

Μεγάλη καλλιέργεια: Αραχίδα: Φυλλοψεκασμοί με διάλυμα 5% ΣΕΚΕΣΤΡΕΝ +
+ διαβρέκτη σε ποσότητα 30 λίτρα νερό/στρέμμα.
1-2 ραντίσματα.

Λαχανικά: Ριζοπότισμα με 50-100 γρ. διαλύματος 2% (2 γρ. στο κιλό νερό), σε κάθε ρίζα, πριν από το πότισμα.

Για καθολική εφαρμογή: (σ' όλη την επιφάνεια) συστήνεται μια μέση δόση 5 γρ./τετρ. μέτρο εδαφικής επιφάνειας.

Χρόνος_εφαρμογής:

Στα δεντρώδη φυτά εφάρμοζε το Σεκεστρέν στο τέλος του χειμώνα για να επωφεληθούν τα φυτά σου στο ακέραιο από την παρουσία του. Στα βαριά εδάφη νωρίτερα. Στα φυλλοβόλα, όρνυτισε να μαρκάρεις από τον προηγούμενο χρόνο τα δέντρα ή κούτσουρα που πάσχουν από έλλειψη σιδήρου (κιτρινο-φύλλιασμα).

Να χρησιμοποιείς Σεκεστρέν προληπτικά και στα γειτονικά, φαινομενικά υγιή φυτά. Έτσι η θεραπεία είναι βέβαια, η ωφέλεια μεγάλη με μικρές δόσεις και το έξοδο μικρό.

Τρόπος_εφαρμογής:

Να κατανέμεις τη δόση έτσι, ώστε να επωφεληθεί όλο το ριζικό σύστημα των φυτών σου. π.χ.:

Διάλυσε τη δόση σε 10-15 κιλά νερό.

Άνοιξε αυλάκι κυκλικό στα όρια της φυλλωσιάς και χύσε το διάλυμα ομοιόμορφα. Σκέπασε το αυλάκι αμέσως και πότισε, μετά, κανονικά. Αυτό εφαρμόζεται κυρίως όταν κάνεις θεραπευτική εφαρμογή σε μεμονωμένα φυτά. Σε αδιαπέρατα ή δυσκολοκατέργαστα εδάφη, μπορείς, για ευκολία, να κάνεις το ίδιο (για δέντρα και μεγάλους θάμνους) με έγχυση χρησιμοποιώντας δηλ. λαστό ή ειδικούς εγχυτήρες (2 τρύπες τουλ. ανά τετρ. μέτρο).

Σε περίπτωση καθολικής εφαρμογής εφάρμοσε διαλυμένο το αναγκαίο Σεκεστρέν ή σε αυλάκι - σε γραμμικές φυτείες - στις δύο πλευρές της κάθε γραμμής, ή σ' όλη την επιφάνεια. Σκέπασέ το αμέσως με σβάρνα ή άλλο μέσο και πότισε.

Στα αμπέλια που ξελακκώνονται, εφάρμοσε το Σεκεστρέν, στους λάκκους λίγο πριν την ισοπέδωση του αμπελώνα.

Εφαρμογή στο φύλλωμα δε συστήνεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα: 50-100 γρ/100 κιλά νερό (όχι περισσότερο, ιδίως στα χλωρωτικά φυτά). Τα καλύτερα αποτελέσματα θα τα έχεις όταν η πρώτη εφαρμογή γίνει με την έναρξη της βλάστησης (στα οπωροφόρα μετά την άνθηση).

Γενικά ίσως χρειαστούν 3-4 ραντίσματα ανά 15 μέρες.

Εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα που περιέχουν βαριά μέταλλα δεν πρέπει να ανακατώνονται με το Σεκεστρέν SG.

Προφυλάξεις:

Μη χρησιμοποιείς δόσεις μεγαλύτερες από τις συστηνόμενες, ιδιαίτερα στους φυλλοψεκασμούς. Εφαρμογή στο έδαφος, σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο για τα φυτά.

Το Σεκεστρέν SG δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, αλλά κατά τη χρήση του παίρνει τα στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης.

- Να μην καταποθεί.
- Αποθήκευσέ το σε μέρος ασφαλές, σκοτεινό, μακριά από παιδιά, ζώα και τρόφιμα.
- Καθάριζε καλά τα δοχεία ανάμιξης και εφαρμογής του Σεκεστρέν. Είναι ελαφριά διαβρωτικό για τα μέταλλα, αν μείνει για πολύ σε επαφή μαζί τους.

Κατάστρεψε τα άδεια σακκίδια με πίεση ή τούπτημα. Η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη.

Σημάνση:

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Συσκευασία: 1) 50 γραμ. σε σακκίδια λαμιναρισμένα (πλαστικοποιημένο χαρτί-αλουμίνιο-πολυαιθυλένιο).
2) 1000 γραμ. σε σάκκους πολυαιθυλενίου μέσα σε χάρτινα κουτιά.


Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτών προκειμένου να ελεγχθεί ως προς τη συμφωνία της με την παρούσα απόφαση και γενικά με το άρθρο 22 του Ν. 721/77.

Η έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-1992.

Β'. Ανακαλούμε την οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο Ιχνοστοιχείο γεωργικό φάρμακο SEQUESTRENE S.P. με αριθμό 10007/26-2-80/86 της αντιπροσώπου εταιρείας CIBA-GEIGY ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ παρασκευής του οίκου CIBA-GEIGY CORP.-Η.Π.Α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο



ΔΗΜ. ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ