



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ
Πληρ.: Λ. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο: 210 9287244
FAX: : 210 92 12 090
E-mail: syg035@minagric.gr**

**Αθήνα, 2 – 6 - 2008
Αριθ. πρωτ.: 119449**

ΠΡΟΣ:

**Syngenta Hellas A.E.B.E.
Λ. Ανθούσας
153 49 – Ανθούσα, Αττικής
(με απόδειξη)**

ΚΟΙΝ.:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
3. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
5. Π.Κ. Π.Φ. και Π.Ε.
Έδρες τους
6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ', Δ' & Ε
της διεύθυνσης μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
8. Π.Ο.Σ.Ε/ Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 7804 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) TOUCHDOWN PREMIUM 36 SL»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την με αριθ. **123904/8-12-2006** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **7804** οριστική έγκριση διάθεση στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **TOUCHDOWN PREMIUM 36 SL**.
3. Το με αριθ. 118518/5-5-2008 συμπληρωματικό σημείωμα του Χημικού ελέγχου για το φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **TOUCHDOWN PREMIUM 36 SL**.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 206/19-9-2007 (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊστάμενους Διεύθυνσης και Προϊστάμενους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Τροποποιούμε τη με αριθ. **7804** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **TOUCHDOWN PREMIUM 36 SL** που χορηγήθηκε με την αριθ. **123904/8-12-2006** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το σημείο 16 (Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης) και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

7804

8 – 12 - 2006

30 – 6 - 2012

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

TOUCHDOWN PREMIUM

1.2.β Μορφή:

Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία (εξ)

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Glyphosate (ομάδα φωσφονογλυκινών)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Glyphosate: 95 % (β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Glyphosate: Syngenta Ltd, Αγγλία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Glyphosate: Monsanto Company, Η.Π.Α.

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Glyphosate όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 6-4-2006 (Αρ. Πρ. ΥΓ 117591) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Syngenta Hellas AEBE
Λ.Ανθούσας-Ανθούσα Αττικής

AME:SYNGR

T.K.15349

Τηλ.:210-6666612-13

Fax: 210-6665777

E-mail: youla.kalliakaki@syngenta.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

Ο κάτοχος της έγκρισης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Ltd, Αγγλία

γ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG, Βέλγιο
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας).

δ) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) Syngenta Crop Protection AG, Βέλγιο
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας).

2) Syngenta Hellas AEBE, Οινόφυτα Βοιωτίας
2^ο χιλιόμετρο Κοινοτικής οδού Αγ. Θωμά

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Glyphosate (υπό μορφή αμμωνιακού άλατος): 36% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 70,6% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο εμπιστευτικό τμήμα του REGISTRATION REPORT (Part C).

2

Συσκευασίες

2.2 Συσκευασίες: (Σύνολο συσκευασιών:12)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	250 κ.εκ., 500 κ.εκ. και 1 λίτρου	PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
2	Δοχεία	5, 10 και 20 λίτρων	PET και HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος ζιζανίων με 20-40 λτ νερό/στρ και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια με το φύλλωμα τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών, προς αποφυγή φυτοτοξικότητας και συσσώρευσης υπολειμμάτων.

Να αποφεύγεται η επαφή ακόμα και με ξυλοποιημένους κορμούς δέντρων, ιδίως πυρηνοκάρπων.

Σε γραμμικές καλλιέργειες εφαρμόζεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και

τρόπος δράσης:

Ζιζανιοκτόνο

Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών αγρωστωδών και πλατυφύλλων ζιζανίων και υδροχαρών.

Απορροφάται από το φύλλωμα των ζιζανίων και μεταφέρεται γρήγορα σε ολόκληρο φυτό. Στο βιοχημικό επίπεδο εμποδίζει την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/στρ.		
Εσπεριδοειδή: -Πορτοκαλιά -Μανταρινιά -Λεμονιά -Γκρέιπ Φρούτ -Κίτρα	Ετήσια ζιζάνια (*) (αγρωστόδη και πλατύφυλλα)	150-200	20-40	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στη ζωηρή βλάστηση.	1
	Πολυετή ζιζάνια (**)	500-750	20-40	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.	
	-Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i>)	750	20-40		
	-Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i>)	500	20-40		
	-Περικοκλάδα (<i>Convolvulus arvensis</i>)	750	20-40		
	-Κύπερη (<i>Cyperus</i> sp.)	500-750	20-40		
Μηλοειδή: -Μηλιά -Αχλαδιά	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	1
Πυρηνόκαρπα: -Βερικοκιά -Νεκταρινιά -Ροδακινιά -Κερασιά	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	1
Αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	1
Ελιές (ελαιοποιήσιμες και επιτραπέζιες συγκομιζόμενες μόνο από το δέντρο)	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	1
Βαμβάκι (***)	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	1
Αγροί μετά την συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	Ως ανωτέρω	1

Ακαλλιέργητες εκτάσεις	Ετήσια ζιζάνια (*) (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)	150-200	20-40	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στη ζωηρή βλάστηση.	1
	Πολυετή ζιζάνια (**) (ως ανωτέρω)	500-750 (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω)	20-40	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.	1
	Ξυλώδεις θάμνοι, δέντρα, βάτα κλπ (**)	750	20-40	Όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη.	1
Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών	Υδροχαρή ζιζάνια (**)	750	20-40	Κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων.	1

(*) Για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων απαιτείται μία εφαρμογή (χειμώνα-άνοιξη) ή (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.

(**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται μία εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.

(***) Με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών.

Παρατηρήσεις

1. Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15 – 30 εκατοστά
2. Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.
3. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για σποροπαραγωγή.
4. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους.
5. Οι πολυετείς καλλιέργειες να είναι ηλικίας άνω των δύο ετών.
6. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Ο ψεκασμός των ζιζανίων στα αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να είναι κατευθυνόμενος κατά μήκος των όχθων, αποφεύγοντας την οποιαδήποτε επαφή του ζιζανιοκτόνου με το νερό.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Αφήστε να περάσουν μετά τον ψεκασμό τουλάχιστον επτά (7) ημέρες για τα ετήσια ζιζάνια ή δεκατέσσερις (14) ημέρες για τα πολυετή ζιζάνια πριν από την κατεργασία του εδάφους ή την επαναφύτευση.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Δεν επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

- 10** Φράσεις R

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

11 Φράσεις S

S1/2 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια
 “Φοράτε κατάλληλες μπότες”
 “Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό”
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

12 Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:**

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγείστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	MRLs (mg/kg)
Glyphosate	Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs με την Οδηγία 2006/60/ΕΚ που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 122108/12-10-2006.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	ΡΗΙ(ημέρες)
Μηλοειδή: -Μηλιά -Αχλαδιά	7 ημέρες
Εσπεριδοειδή: -Πορτοκαλιά -Μανταρινιά -Λεμονιά -Γκρέιπ Φρούτ -Κίτρα	7 ημέρες
Πυρηνόκαρπα: -Ροδακινιά -Βερυκοκιά -Νεκταρινιά -Κερασιά	7 ημέρες
Ελιές (επιτραπέζιες, ελαιοποιήσιμες)	7 ημέρες
Αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)	7 ημέρες
Βαμβάκι	7 ημέρες
Ακαλλιέργητες εκτάσεις	-

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

15 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο Παράρτημα I (Annex I) του registration report καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

16 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΧΑΤΖΗ**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**

Δ – 7 (GAP)**ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)	Glyphosate 36%	Σελίδες	:1/2
EEC No (α)	:	Χώρα	: ΕΛΛΑΔΑ
Εμπορικό (ά) όνομα (τα)	Touchdown Premium 36SL		
Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο	Ζιζανιοκτόνο		

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσμα-τος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
(α)			(β)	(γ)	Μορφή	Περιε κ σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος	Στάδιο Ανάπτυ- ξης και εποχή	Αριθμός Εφαρμογ ών Ελάχ. Μεγ.	Χρονικό μεσοδιάστη μα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	Χγρ δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.	Χγρ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
Μηλοειδή -Μήλα -Αχλάδια	ΕΛΛΑΔΑ	Touchdown Premium 36SL	Α	<i>Ετήσια Ζιζάνια</i>	SL	36%	Ψεκασμός		1	-	-	200- 400	0.54 – 0.72	7	
				<i>Πολυετή Ζιζάνια</i>									1.8 – 2.7		
Εσπεριδοειδή - Πορτοκάλια - Μανταρίνια - Λεμόνια - Γκρέιπ Φρουτ - Κίτρα	ΕΛΛΑΔΑ	Touchdown Premium 36SL	Α	<i>Ετήσια Ζιζάνια</i>	SL	36%	Ψεκασμός		1	-	-	200-400	0.54 – 0.72	7	
				<i>Πολυετή Ζιζάνια</i>									1.8 – 2.7		
Πυρηνόκαρπα - Ροδάκινα - Βερύκοκα - Νεκταρίνια - Κεράσια	ΕΛΛΑΔΑ	Touchdown Premium 36SL	Α	<i>Ετήσια Ζιζάνια</i>	SL	36%	Ψεκασμός		1	-	-	200-400	0.54 – 0.72	7	
				<i>Πολυετή Ζιζάνια</i>									1.8 – 2.7		
Ελιές	ΕΛΛΑΔΑ	Touchdown Premium 36SL	Α	<i>Ετήσια Ζιζάνια</i>	SL	36%	Ψεκασμός		1	-	-	200-400	0.54 – 0.72	7	
				<i>Πολυετή ζιζάνια</i>									1.8 – 2.7		
Αμπέλι	ΕΛΛΑΔΑ	Touchdown Premium 36SL	Α	<i>Ετήσια Ζιζάνια</i>	SL	36%	Ψεκασμός		1	-	-	200-400	0.54 – 0.72	7	
				<i>Πολυετή ζιζάνια</i>									1.8 – 2.7		
Βαμβάκι	ΕΛΛΑΔΑ	Touchdown Premium 36SL	Α	<i>Ετήσια Ζιζάνια</i>	SL	36%	Ψεκασμός		1	-	-	200-400	0.54 – 0.72	7	
				<i>Πολυετή ζιζάνια</i>									1.8 – 2.7		

Δ – 7 (GAP)**ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)	Glyphosate 36%	Σελίδες	:2/2
EEC No (α)	:	Χώρα	: ΕΛΛΑΔΑ
Εμπορικό (ά) όνομα (τα)	Touchdown Premium 36SL		
Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο	Ζιζανιοκτόνο		

1	2	3	4	5	6		7			8			9	10	
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκεύασμα-τος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή			Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις	
(α)			(β)	(γ)	Μορφή	Περιε κ σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος	Στάδιο Ανάπτυ- ξης και εποχή	Αριθμός Εφαρμογ ών Ελάχ. Μεγ.	Χρονικό μεσοδιάστη μα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	Χγρ δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελαχ. μεγ.	Χγρ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
Αγροί μετά την συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά	ΕΛΛΑΔΑ	Touchdown Premium 36SL	A	Ετήσια Ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια	SL	36%	Ψεκασμός		1	-	-	200-400	0.54 – 0.72 1.8 – 2.7	Δ/Ο	
Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών	ΕΛΛΑΔΑ	Touchdown Premium 36SL	A	Υδροχαρή Ζιζάνια	SL	36%	Ψεκασμός		1	-	-	200-400	2.7	Δ/Ο	
Ακαλλιέργητες εκτάσεις	ΕΛΛΑΔΑ	Touchdown Premium 36SL	A	Ετήσια Ζιζάνια Πολυετή Ζιζάνια	SL	36%	Ψεκασμός		1	-	-	200-400	0.54 – 0.72 1.8 – 2.7	Δ/Ο	

Παρατηρήσεις:

(α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).

(β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).

(γ) πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια

(δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)

(ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.

(στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται

(ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.

(η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται

(θ) g/kg ή g/l

(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής

(κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες

(λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή

(μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση