



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 05-04-2016  
Αριθ. πρωτ: 12673/144919ΠΕ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη  
Τηλέφωνο: 210 92 87 250  
e-mail: [mgaspari@minagric.gr](mailto:mgaspari@minagric.gr)

Προς: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ  
Λ. Ανθούσας  
Ανθούσα 15349 Αττικής  
  
(με απόδειξη)

**ΘΕΜΑ:** “Τροποποίηση της με αριθ. 60346 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SWITCH 25/37.5 WG (δ.ο. fludioxonil / cyprodinil) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.”

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ**  
**ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Καν. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Το σημείωμα από την αρμόδια αρχή αξιολόγησης (ΜΦΙ)
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/400 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2015 , για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για bone oil arbon monoxide, cyprodinil, dodemorph, iprodione, metaldehyde, metazachlor, paraffin oil

(CAS 64742-54-7), petroleum oils (CAS 92062-35-6) και propargite μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

6. Την υπ' αριθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015), με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων"
7. Τη με αριθ. 12674/144923/23-12-2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα από 29-1-2016 και συμπληρωματικά στοιχεία .

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**I.** Τροποποιούμε τη με αριθ. **60346** έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **SWITCH 25/37.5 WG (δ.ο. fludioxonil / cyprodinil)**, που χορηγήθηκε με την αριθ. **639/6916/18-1-2013** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς **το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.**

**Συγκεκριμένα τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής :**

| <b>5 5.1 Φάσμα δράσης</b>        |  |                      |                             |                                  |  |  |
|----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|
| Πεδίο Εφαρμογής                  | Στόχος   | Δόσεις σκευάσματος   |                             |                                  | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής  | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|                                  |  | κ.εκ/ στρέμ μα (max) | κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα |  |  |
| Αμπέλι Οινοποιήσιμο              | <i>Botrytis cinerea</i><br><i>Aspergillus spp.</i> | 100                  | 80-100                      | 80-100                           | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την άνθηση έως την ωρίμανση. | 1  |
| Αμπέλι Επιτραπέζιο Σταφίδα       | <i>Botrytis cinerea</i><br><i>Aspergillus spp.</i> | 100                  | 80-100                      | 80-100                           | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την άνθηση έως την ωρίμανση. | 1  |
| Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά (Υ & Θ) | <i>Botrytis spp.</i><br><i>Sclerotinia spp.</i>    | 100                  | 80-100                      | 80-100                           | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την άνθηση έως               | 1  |

|   |   |     |        |        |  |   |
|---|---|-----|--------|--------|--|---|
|   |   |     |        |        | και την<br>ωρίμανση  |   |
| Κολοκυνθοειδ<br>ή:<br>Αγγούρι<br>Κολοκύθι<br>Αγγουράκι για<br>τουρσί<br>(Υ & Θ) | <i>Botrytis</i> spp.<br><i>Sclerotinia</i> spp.     | 100 | 80-100 | 80-100 | Προληπτική<br>εφαρμογή όταν<br>οι συνθήκες<br>ευνοούν την<br>ανάπτυξη των<br>ασθενειών Από<br>τον σχηματισμό<br>των πρώτων<br>καρπών έως και<br>την ωρίμανση   | 1 |
| Καρότο<br>(Υ)   | <i>Alternaria</i> spp.<br><i>Sclerotinia</i> spp.   | 80  | 100    | 80     | Προληπτική<br>εφαρμογή όταν<br>οι συνθήκες<br>ευνοούν την<br>ανάπτυξη των<br>ασθενειών Από<br>το στάδιο των 4<br>φύλλων έως την<br>πλήρη<br>ανάπτυξη           | 1 |
| Μάραθος<br>(Υ)  | <i>Alternaria</i> spp.<br><i>Sclerotinia</i> spp.   | 80  | 100    | 80     | Προληπτική<br>εφαρμογή όταν<br>οι συνθήκες<br>ευνοούν την<br>ανάπτυξη των<br>ασθενειών Από<br>το στάδιο των 4<br>φύλλων έως την<br>πλήρη<br>ανάπτυξη           | 1 |
| Κρεμμύδι<br>ξηρό Σκόρδο<br>Ασκαλώνια<br>(Υ)                                     | <i>Botrytis squamosa</i><br><i>Sclerotinia</i> spp. | 100 | 120    | 80     | Προληπτική<br>εφαρμογή όταν<br>οι συνθήκες<br>ευνοούν την<br>ανάπτυξη των<br>ασθενειών Από<br>το στάδιο των<br>10 φύλλων έως<br>την έναρξη του<br>πλαγιάσματος | 1 |
| Κρεμμύδι<br>φρέσκο<br>(Υ)   | <i>Botrytis squamosa</i><br><i>Sclerotinia</i> spp. | 100 | 120    | 80     | Προληπτική<br>εφαρμογή όταν<br>οι συνθήκες<br>ευνοούν την  | 1 |

|   |   |     |     |     |  |   |
|---|---|-----|-----|-----|--|---|
|   |   |     |     |     | ανάπτυξη των ασθενειών Από το στάδιο των 5 φύλλων έως την πλήρη ανάπτυξη   |   |
| Μαρούλι, Σαλάτα, Αντίδι, Αρωματικά φυτά (Υ & Θ) | <i>Botrytis cinerea</i><br><i>Sclerotinia spp.</i>  | 60  | 60  | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών Από το πρώτο φύλλο έως την πλήρη ανάπτυξη του φυλλώματος       | 1 |
| Σπαράγγι  | <i>Stemphylium botryosum</i><br><i>Stemphylium versicarium</i><br><i>Botrytis cinerea</i> | 100 | 100 | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών έως την πλήρη ανάπτυξη   | 1 |
| Φράουλα (Υ & Θ)                                 | <i>Botrytis cinerea</i><br><i>Colletotrichum spp.</i>                                     | 100 | 125 | 80  | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών Από την εμφάνιση των ανθέων έως το δεύτερο χέρι της συγκομιδής | 1 |
| Φασολάκι με λοβό (Υ & Θ)                        | <i>Botrytis cinerea</i><br><i>Sclerotinia spp.</i><br><i>Colletotrichum spp.</i>          | 100 | 100 | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών Από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως τον σχηματισμό των λοβών   | 1 |
| Οσπρια (φασόλια)                                | <i>Botrytis cinerea</i><br><i>Sclerotinia spp.</i><br><i>Colletotrichum spp.</i>          | 100 | 100 | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των  | 1 |

|   |  |     |        |     |   |                                  |
|---|--|-----|--------|-----|---|----------------------------------|
|   |  |     |        |     | ασθενειών Από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως τον σχηματισμό του 40% των λοβών                                      |                                  |
| Μηλοειδή:<br>Μήλα<br>Αχλάδια<br>Κυδώνια | <i>Gloeosporium spp.</i><br><i>Botrytis cinerea</i><br><i>Penicillium spp.</i><br><i>Alternaria spp.</i><br><i>Monilia spp.</i><br><i>Colletotrichum spp.</i><br><i>Nectria spp</i><br><i>Fusarium spp.</i><br><i>Ventruria sp .</i> | 100 | 80-100 | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών Από την έναρξη της άνθησης έως την ωρίμανση | 1                                |
|   | Μετασυλλεκτικές ασθένειες.<br><i>Ventruria sp .</i><br><i>Nectria spp</i><br><i>Monilia spp.</i>   | 100 | 80-100 | 100 | Προληπτική εφαρμογή για την αντιμετώπιση μετασυλλεκτικών ασθενειών  |                                  |
| Ροδάκια<br>Νεκταρίνια<br>Βερύκοκκα      | <i>Monilia spp.</i>  | 100 | 60-100 | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών Από την έναρξη της άνθησης έως την ωρίμανση | 1                                |
| Κεράσια                                 | <i>Monilia spp.</i>  | 100 | 60-100 | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών Από το ροζ μπουμπούκι έως την ωρίμανση      | 1                                |
| Δαμάσκηνα                               | <i>Monilia spp.</i>  | 100 | 60-100 | 100 | Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών Από την έναρξη της άνθησης έως την ωρίμανση | 1                                |
| Καπνός                                  | <i>Sclerotinia spp.</i>  | 60  | --     | 60  | Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες  | 2<br>Μεσοδιάστημα<br>α 14 ημέρες |

|   |  |     |     |     |  |   |
|---|--|-----|-----|-----|--|---|
|   |  |     |     |     | ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την ενάρξη και κατά τη διάρκεια της άνθησης |   |
| Ανθοκομικά:<br>Ανεμώνη<br>Μπιγκόνια<br>Κυκλάμινο<br>Βιόλα<br>Βιολέτα<br>Πελαργόνιο<br>Πρίμουλα<br>Τριαντάφυλλο<br>Γαρύφαλλο<br>Χρυσάνθεμο<br>Φίκος<br>Μπένζιαμιν<br>Ζέρμπερα<br>Πανσές<br>Γεράνι<br>Πριμούλα<br>Εξάκον<br>Ορτανσία<br>Αζαλέα<br>Γυψοφύλη<br>Κάκτοι<br>παχύφυτα<br>Λυσιάνθος<br>Βιβούρνο σε πλαστικά τούνελ<br>Ντιόσμα σε πλαστικά τούνελ<br>Γκιουλθέρια<br>Ίλεξ<br>Παιόνια<br>(Υ+Θ) | <i>B. cinerea</i><br><i>Aspergillus spp.</i> | 100 | 100 | 100 | Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών          | 1 |
| <b>Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας</b>  |  |     |     |     |  |   |

|  |                 |        |
|--|-----------------|--------|
| <b>13.2</b> Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις | Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|--|-----------------|--------|

|  |  |         |
|--|--|---------|
|  | Αμπέλι επιτραπέζιο   | 7       |
|  | Αμπέλι οινοποιήσιμο  | 21      |
|  | Μελιτζάνα -πιπεριά-τομάτα- Αγγούρι<br>Κολοκύθι- Αγγουράκι για <i>τουρσί</i><br>(Α+Θ) | 3       |
|  | Καρότο- Κρεμμύδι ξηρό<br>- κρεμμύδι φρέσκο   | 7       |
|  | Ασκαλώνια-Σκόρδο   | 14      |
|  | Μαρούλι- Σαλάτα - Αντίδι, -<br>Αρωματικά φυτά (Α+Θ)                                  | 7       |
|  | Μάραθος  | 7       |
|  | Σπαράγγι   | 6 μήνες |
|  | Φράουλα (Α)  | 2       |
|  | Φράουλα (Θ)  | 1       |
|  | Ανθοκομικά (Α+Θ)   | -       |
|  | Φασολάκι με λοβό (Α)   | 14      |
|  | Φασολάκι με λοβό (Θ)   | 3       |
|  | Όσπρια (φασόλια)   | 28      |
|  | Μήλα, αχλάδια, κυδώνια   | 3       |
|  | Βερίκοκα, νεκταρίνια, ροδάκινα,<br>δαμάσκηνα, κεράσια                                | 7       |
|  | καπνός   | 7       |

**II.** Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. **639/6916/18-1-2013** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **60.346** άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SWITCH 25/37.5 WG** (δ.ο. **fludioxonil / cyprodinil**) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**III.** Την επόμενη ημέρα από την υπογραφή της παρούσας απόφασης, το σκεύασμα που διατίθεται στην αγορά πρέπει να φέρει ετικέτα σύμφωνη με τα οριζόμενα σε αυτή.

**IV.** Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.

**V.** Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες. Οι τελευταίοι βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.

**VI.** Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ Φ.Π.**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**