

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα εάν η έκθεση στο σκεύασμα είναι μεγάλη.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυνθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο ερεθισμός επιμένει.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο ερεθισμός επιμένει.

Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε δύο μεγάλα ποτήρια νερό. Προκαλέστε εμετό βάζοντας το δάκτυλο βαθιά μέσα στο λαιμό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.

Τρόπος δράσης: Το imazamox (ομάδα ιμιδαζολινονών) αναστέλλει τη δράση της συνθετάσης του ακετουλακτικού (ALS).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το ψεκαστικό βυτίο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Για τον ηλιάνθο, προσθέτουμε το DASH HC υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με το υπόλοιπο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και ποικιλίες, για τις συσυνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από τη ζέση, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες όχι πάνω από 20° C.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: -

Συνδυαστικότητα: -

Προφυλάξεις για τους χειριστές: -

L1035628 GREC/9V PPE4086773

 **Listego**[®]
4 SL

syngenta[®]

imazamox (ιμαζαμόξ)
(χημική ομάδα ιμιδαζολινονών)

Πυκνό διάλυμα (SL)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά:
70033/11-03-2013

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Imazamox 4% β/ο (4,22% άλας αμμωνίου)
Βοηθητικές ουσίες: 96% β/β

Ζιζανιοκτόνο διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό, με δράση από το φύλλωμα και το έδαφος για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων στον ηλιάνθο.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Παράδοσης 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. 210-6860130 - www.basf-agro.gr
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lte

ΠΡΟΣΟΧΗ



• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Χρονική διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σοράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Στον αγρό που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο, μπορούν να σπαρθούν την ίδια καλλιεργητική περίοδο, φασόλια, μπιζέλια ή σόγια, μετά από βαθιά άροση. Να μην σπέρνονται α) Σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, ρεβίθια, ηλιάνθος ή καπνός πριν περάσουν 4 μήνες, β) Καθαμπόκι, βαμβάκι, πατάτα ή ρύζι πριν περάσουν 9 μήνες, γ) Ζαχαρότευτλα ή ελαιοκράμβη πριν περάσουν 12 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να αποφεύγεται η χρήση του σε ελαφρά εδάφη (αμμώδη, οργανική ουσία <2%, υψηλό υδροφόρο ορίζοντα), σε χαμηλές θερμοκρασίες και εντατικά αρδευόμενες καλλιέργειες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ηλιάνθος, δεν εφαρμόζεται.

Φάσμα Δράσης:

Πεδίο εφαρμογής:

Ηλιάνθος (*Helianthus annuus*). Χρησιμοποιείται μόνο σε ποικιλίες Ηλιάνθου τύπου Clearfield, οι οποίες έχουν επιλεγεί για ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο imazamox.

Στόχος:

Αγριοβαμβάκι, Βλήτα, Λουβουδιά, Οροβάγχη, Ποθικόμπι, Αγριοπιπεριά, Ρανούγκουθος, Μαρτιάκος, Σετάριες, Στύφνος, Βέλιουρας, Ασπράγκαθο, Αγριομελιτζάνα, Μουχρίτσα. **Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια:** Βούτομο, Κύπερη, Αιματόχορτο, Καπνόχορτο, Κεχρί, Φάραρη, Αντράκλα.

Δόση: 100 κ.εκ.σκ./στρέμμα (max) + 50 κ.εκ. DASH με όγκο ψεκ. υγρού 20-30 λίτρα/στρέμμα.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Μία εφαρμογή στο διάστημα μεταξύ της εμφάνισης των πρώτων 4 πραγματικών φύλλων και μέχρι την εμφάνιση των 6 πραγματικών φύλλων στο φυτό του ηλιάνθου.

Μείνιτος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Παρατηρήσεις:

Το DASH HC είναι επιφανειοδραστικό σκεύασμα το οποίο μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του LISTEGO 4 SL.

