

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ο. Μελιτά  
FAX: 210 92 12 090  
Τηλέφωνο: 210 92 87 244  
e-mail: [omelita@minagric.gr](mailto:omelita@minagric.gr)

Αθήνα, 07.05.2020  
Αριθμ. πρωτ: 4339/116669

Προς: Syngenta Hellas AEBE  
Λ. Ανθούσας, 15349 Ανθούσα Αττικής  
e-mail: [voula.kalliakaki@syngenta.com](mailto:voula.kalliakaki@syngenta.com)

**ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) CALLISTO PLUS 5/12 SC (δ.ο. mesotrione 5% β/ο, dicamba 12% β/ο)»**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι δραστικές ουσίες **mesotrione και dicamba**.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2017/725 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2017 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας **mesotrione**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.

8. Τη με αριθμό πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας.
9. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
11. Την από 28.02.18 αξιολόγηση (Registration Report) του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και επικαιροποίηση αυτής (20.06.2018).
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. 8852/85057/07.08.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και τα υπ' αριθ. πρωτ. 10585/102488/02.10.2017, 13166/128512/30.11.2017, 214/4485/09.01.2018 και 857/12991/22.01.2019 συμπληρωματικά στοιχεία.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A** Ανανεώνουμε την άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CALLISTO PLUS 5/12 SC** της εταιρείας **Syngenta Hellas ΑΕΒΕ**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία 1<sup>ης</sup> ανανέωσης  
1.1.γ Ημερομηνία λήξης

|                   |
|-------------------|
| <b>70211</b>      |
| <b>24.05.2017</b> |
| <b>07.05.2020</b> |
| <b>31.12.2021</b> |

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **CALLISTO PLUS 5/12 SC**  
1.2.β Μορφή Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

##### **1.3 Δραστικές Ουσίες**

###### **Δραστική Ουσία 1.**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

**mesotrione**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

**92 % (β/β) min**

Χημική ομάδα:

**Τρικετόνες**

Παρασκευαστής:

**Syngenta Crop Protection AG, Ελβετίας**  
CH 4058– Basel, Ελβετία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Syngenta Crop Protection Monthey SA**  
Route de l'Île au Boios  
CH-1870 Monthey, Ελβετία
- 2. Shenyang Sciencreat Chemicals Co., Ltd**  
Xihejiubei Street 17,  
Chemical Industry Area,  
Shenyang Economy and Technology Development Zone  
Shenyang Liaoning P.R. Postcode 110144, Κίνα
- 3. Anhui Zhongshan Chemical Industry Co., Ltd**  
Xiangyu Town Chemical Industry Park,  
Dongzhi County, Anhui Province 247260, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας mesotrione όπως αυτές κατατέθηκαν με την υπ' αριθ. πρωτ. 8852/85057/07.08.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο part C της έκθεσης αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## Δραστική Ουσία 2.

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

**dicamba**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

85 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Βενζοϊκά παράγωγα

Παρασκευαστής:

**Syngenta Crop Protection AG, Ελβετίας**  
CH 4058– Basel, Ελβετία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. BASF Corporation**  
Beaumont Plant  
14385 West Port Arthur Road  
Beaumont, Texas 77705, ΗΠΑ
- 2. Jiangsu Changqing Agrochemical Nantong Co., Ltd**  
No. 3 Haibin Road, Chemical Industrial Zone,  
Open Coastal Economic Zone, Rudong County,  
Nantong city, Jiangsu 246407, Κίνα
- 3. Youjia Crop Protection Co. LTD**  
Fifth TongHai Road,  
Rudong Coastal Economic Development Zone,  
Nantong, Jiangsu, 226407, P.R. Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας dicamba όπως αυτές κατατέθηκαν με την υπ' αριθ. πρωτ. 8852/85057/07.08.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο part C της έκθεσης αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**Syngenta Hellas AEBE**  
Λ. Ανθούσης-Ανθούσα Αττικής  
Τ.Κ.15349  
Τηλ.:210-6666612-13  
Fax:210 6665777  
E-mail: [youla.kalliakaki@syngenta.com](mailto:youla.kalliakaki@syngenta.com)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Syngenta Hellas AEBE**  
Λ. Ανθούσης-Ανθούσα Αττικής  
Τ.Κ.15349  
Τηλ.:210-6666612-13  
Fax:210 6665777  
E-mail: [youla.kalliakaki@syngenta.com](mailto:youla.kalliakaki@syngenta.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**Syngenta Hellas AEBE**  
Λ. Ανθούσης-Ανθούσα Αττικής  
Τ.Κ.15349  
Τηλ.:210-6666612-13  
Fax:210 6665777  
E-mail: [youla.kalliakaki@syngenta.com](mailto:youla.kalliakaki@syngenta.com)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Syngenta Crop Protection AG**  
CH 4058 – Basel, Ελβετία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Syngenta Production France S.A.S.**  
Route de la Gare  
F-30670 Aigues – Vives, Γαλλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Syngenta Hellas AEBE**  
2° χιλιόμετρο Κοινοτικής οδού Οινοφύτων-Αγ.Θωμά  
Οινόφυτα-Βοιωτίας
2. **Syngenta Production France S.A.S.**  
Route de la Gare  
F-30670 Aigues – Vives, Γαλλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: mesotrione 5% β/ο  
dicamba 12% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 82,55% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 8852/85057/07.08.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι και στο part C της έκθεσης αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσσκευασίες

| A/A | Είδος   | Μέγεθος            | Υλικό                            |
|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
| 1   | Δοχείο  | 500 κ.εκ.          | HDPE/PA<br>PET<br>f-HDPE<br>HDPE |
| 2   | Μπιτόνι | 1, 5, 10, 20 λίτρα | HDPE/PA<br>PET<br>f-HDPE<br>HDPE |

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

### Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος με ψεκαστήρες όλων των τύπων και μπεκ τύπου σκούπας και όγκο ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα νερού στο στρέμμα.

### Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείτε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Στη συνέχεια προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

### Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο και πλύνετε το καλά μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας, ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** -

## 4 Κατηγορία και

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών

|                |  |
|----------------|--|
| τρόπος δράσης: | πλατυφύλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Περιέχει τα δραστικά συστατικά mesotrione το οποίο ανήκει στη ομάδα των τρικετονών που παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD και το dicamba το οποίο ανήκει στην ομάδα των Βενζοϊκών παραγώγων. Το σκεύασμα απορροφάται από το στέλεχος, τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό αναστέλλοντας την ανάπτυξη του. |
|----------------|--|

| 5 Φάσμα δράσης      |   |                    |   |  |   |  |
|---------------------|---|--------------------|---|--|---|--|
| Πεδίο Εφαρμογής     | Στόχος  | Δόσεις σκευάσματος |   |  | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής   | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|                     |   | κ.εκ/<br>στρέμμα   | κ.εκ./<br>100<br>λίτρα<br>ψεκ.<br>Υγρού | Όγκος<br>ψεκ.<br>υγρού<br>λίτρα /<br>στρέμμα |   |  |
| Αραβόσιτος<br>ΖΕΑΜΧ | <u><b>Ευαίσθητα ζιζάνια</b></u><br><b>Αγριοβαμβακιά</b><br><i>Abutilon theophrasti</i><br>ABUTH<br><b>Βλήτο</b><br><i>Amaranthus retroflexus</i><br>AMARE<br><b>Λουβουδιά</b><br><i>Chenopodium album</i><br>CHEAL<br><b>Αγριοπιπεριά</b><br><i>Polygonum persicaria</i><br>POLPE<br><b>Αγριοτοματιά</b><br><i>Solanum nigrum</i><br>SOLNI<br><b>Μεγάλη περικοκλάδα</b><br><i>Calystegia sepium</i><br>CAGSE<br><b>Τάτουλας</b><br><i>Datura stramonium</i><br>DATST<br><b>Αγριομελιτζάνα</b><br><i>Xanthium spp.</i><br>XANSS<br><b>Κίρσιο</b><br><i>Cirsium arvense</i><br>CIRAR<br><br><u><b>Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια</b></u> | 200                | --                                      | 10-40  | Ψεκασμός φυλλώματος μεταφυτρωτικά Από τα 2 μέχρι τα 9 φύλλα της καλλιέργειας (BBCH 12-19) | 1  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p><b>Πολύγονο</b><br/><i>Polygonum convolvulus</i><br/>POLCO</p> <p><b>Λαπάτσα</b><br/><i>Polygonum lapathifolium</i><br/>POLLA</p> <p><b>Περικοκλάδα</b><br/><i>Convolvulus arvensis</i><br/>CONAR</p> <p><b>Ραπανίδα</b><br/><i>Raphanus raphanistrum</i><br/>RAPRA</p> <p><b>Μαρτιάκος</b><br/><i>Senecio vulgaris</i><br/>SENVU</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

**Παρατηρήσεις:**

Μπορεί να πραγματοποιηθεί και σπαστή εφαρμογή του σκευάσματος με 2 εφαρμογές:

Η πρώτη στο στάδιο ανάπτυξης 2 μέχρι 6 φύλλων της καλλιέργειας (BBCH 12-16) με 130 κ.εκ/στρ και η δεύτερη στο στάδιο ανάπτυξης των 8 με 9 φύλλων της καλλιέργειας (BBCH 18-19) με 70 κ.εκ/στρ.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι.
- Αποφύγετε την τυχαία επαφή του σκευάσματος CALLISTO PLUS 5/12 SC ή τη μετακίνηση του ψεκαστικού νέφους προς γνωστές ως ευαίσθητες παρακαείμενες καλλιέργειες: μηδική, τεύτλα, μουστάρδα, ηλίανθος, ελαιοκράμβη, αρακάς, καλλιέργειες ψυχανθών, τριφύλλι, πατάτα, σόγια, καπνός, καλλιέργειες λουλουδιών και καλλωπιστικών φυτών, αμπέλι και οπωροφόρα δέντρα.
- **Διαχείριση Ανθεκτικότητας**  
Το σκεύασμα περιέχει mesotrione, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα F2 (27) κατά HRAC και dicamba, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα O (4) κατά HRAC.  
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ακολουθείτε τις παρακάτω γεωργικές πρακτικές:
  - Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ).
  - Να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί μόνο αραβόσιτος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

-Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί το φθινόπωρο να σπαρθούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη) και την επόμενη άνοιξη ηλίανθος, αφού προηγηθεί βαθειά άροση.

- να μην σπέρνονται βαμβάκι πριν περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες και ζαχαρότευτλα, παντζάρι, σπανάκι, αρακάς, φασόλι και σόγια πριν περάσουν τουλάχιστον 20 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. Απαιτείται άροση πριν από τη σπορά/ φύτευση των καλλιεργειών που θα ακολουθήσουν.


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε σε αγρούς που έχει γίνει εφαρμογή έως ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκασμένη φυλλική επιφάνεια.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκεύασμα CALLISTO PLUS 5/12 SC, δεν είναι φυτοτοξικό στον αραβόσιτο όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου:



**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H361d:** Υποπτο για την πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUΗ208:** Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.



**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης

|  |
|--|
| <p><b>P102:</b> Μακριά από παιδιά.</p> <p><b>P405:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p><b>P270:</b> Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p><b>P280:</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.</p> <p><b>P201:</b> Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.</p> <p>Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση/ εφαρμογή του σκευάσματος.</p> <p>Να φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια.</p> <p><b>P501:</b> Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p> <p><b>SP1:</b> Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.<br/>(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά στα επιφανειακά νερά / Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αγροκτήματα και δρόμους).</p> <p><b>SPe3:</b> Για να προστατέψετε τα <b>φυτά μη-στόχους</b> να αφήσετε από τη γεωργική γη μίαν απέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.</p> <p><b>EUH401:</b> Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p> |
|--|

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:**

**Γενικά:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

**P308 + P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύντε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείται.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες  |
|-----------------|---|
| Αραβόσιτος      | Δεν ορίζεται<br>(τελευταία εφαρμογή του προϊόντος στα 9 φύλλα της καλλιέργειας) |

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια.

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαιψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά ακόλουθα στοιχεία:

1. ***An analytical method for the determination of relevant impurity R287431 in A17072C with an acceptable (according to the set specification) validated LOQ (0.1 µg/g), should be submitted.***
2. ***Finalization of the assessment of the data to further address the toxicological profile of metabolite AMBA (at RMS level as confirmatory data of the ai). Pending the assessment of the confirmatory data, the residue definition in feed commodities is considered as provisional.***
3. ***Finalization of the peer review for the toxicological data provided for MNBA before a final conclusion can be made on the relevance of MNBA.***

**B**

Για τα αποθέματα με ετικέτα σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 5826/56878/24.05.2017 απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70211 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **CALLISTO PLUS** (δ.ο. mesotrione 5% β/ο, dicamba 12% β/ο), όπως αυτή τροποποιήθηκε, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι μήνες ακόμη (έως την 07.11.2020).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για δεκαεπτά επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως την 07.10.2021).
3. Επιτρέπεται τη χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες για δεκαοκτώ επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως την 07.11.2021).
4. Ορίζεται ότι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των ορισθεισών προθεσμιών, θα πρέπει να επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ

**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α.**

**Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ**