

L1072591 GREC/3Z PPE4134810


**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. •Φοράτε μάσκα, γυαλιά και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. •Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

**Γενικά:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αρμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυνθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέστε. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210 7793777

**Cidely® Top**  
125/15 DC



Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME™,  
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON™  
are Trademarks of a Syngenta Group Company

500 ml e

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**



- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49  
Τηλ.: 210 6666612-13 [www.syngenta.gr](http://www.syngenta.gr)  
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σινδος, Τηλ.: 231 0796940-3



L1072591 GREC/3Z PPE4134810

**Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**

**Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.**

**Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 3 μέτρων  
και μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης μήκους 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.**

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**Τρόπος δράσης:**

Το Cidely Top είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Περιέχει τα δραστικά συστατικά Difenoconazole (τριαζόλη) που κινείται διελασματικά και δρα προηππικά και θεραπευτικά και Cyflufenamid (amidoxime) που κινείται διελασματικά, παρουσιάζει τάση ατμών και έχει προηππική, υποηππιματική και θεραπευτική δράση. Καταπολεμά μυκητοποιικές ασθένειες σε τομάτα, καρπούζι, πεπόνι, αγγούρι, κολοκύθι, φράουλα, πιπεριά και μελιτζάνα.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μπχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του Cidely Top και ανακινείστε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μπχάνημα και ειδικά τα ακροφύσια έχουν καθαριστεί πριν τον ψεκασμό. Τα ψεκαστικά μπχανήματα πρέπει να ρυθμιστούν /επεγχθούν με ακρίβεια για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο ωίδιο, οι εφαρμογές με σκευάσματα που περιέχουν το δραστικό συστατικό cyflufenamid να μην ξεπερνούν το 1/3 των εφαρμογών ανά καλπηεργυπτική περίοδο των προγραμμάτων φυτοπροστασίας.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μπχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτελούν σε σημεία συλληπογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## **Προφυλάξεις για τους χειριστές:**

Φοράτε γάντια κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαπλύματος και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος και σε χρήση στο θερμοκήπιο φοράτε φόρμα κατά την παρασκευή και χρήση του σκευάσματος.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντοπληγικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστει:**

**Το σκεύασμα είναι συμβατό με προγράμματα IPM.** To Cidely Top, είναι συμβατό με τα ωφέλιμα *Orius laevigatus*, *Amblyseius Swirskii*, *Encarsia formosa*, *Eretmocerus mundus* και *Nesidiocoris tenuis* που χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας (μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες και με δόση 100K.εκ/100λίτρα ψεκαστικό υγρό με όγκο ψεκαστικού έως 100λίτρα/στρ.).

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:**

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάπλυμα από την ψεκαζόμενη φυτλική επιφάνεια.

**Φυτοτοξικότητα:** Το σκεύασμα Cidely Top, δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Τομάτα (Α/Θ), Πεπόνι (Α/Θ), Καρπούζι (Α/Θ), Κολοκύθι (Α/Θ), Αγγούρι (Α/Θ), Φράουλα (Α/Θ), Πιπεριά (Α/Θ), Μελιτζάνα (Α/Θ): 3 ημέρες.

## **Φάσμα δράσης:**

**Τομάτα (Α):** Για Αλτερναρίωση (*Alternaria solani*), Κλαδοσπορίωση (*Fulvia fulva*) 100 κ.εκ./στρέμα (max) ή 100 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/στρέμα. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 20-89). Μέχρι 2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.

**Τομάτα (Θ):** Για Ωδίο (*Leveillula taurica*, *Erysiphe lycopersici*, *Oidium lycopersici*), Αλτερναρίωση (*Alternaria solani*), Κλαδοσπορίωση (*Fulvia fulva*) 100 κ.εκ./στρέμα (max) ή 100 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/στρέμα. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 20-89). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες.

**Πεπόνι (Α/Θ), Καρπούζι (Α/Θ), Αγγούρι (Α/Θ), Κολοκύθι (Α/Θ):** Για Ωδίο (*Podosphaera xanthii*, *Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*, *Golovinomyces cichoracearum*), Αλτερναρίωση (*Alternaria cucumerina*), Μαύρη σήψη (*Didymella bryoniae*), Κλαδοσπορίωση (*Cladosporium cucumerinum*) 100 κ.εκ./στρέμα (max) ή 100 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/στρέμα. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 20-89). Μέχρι 2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.

**Φράουλα (Α/Θ):** Για Ωδίο (*Sphaerotheca macularis*, *Podosphaera macularis*), Ανθράκωση (*Colletotrichum acutatum*, *Mycosphaerella fragariae*), Αλτερναρίωση (*Alternaria spp*) 100 κ.εκ./στρέμα (max) ή 100 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/στρέμα. Ψεκασμός φυλλώματος. Μετά την έκπτυξη του 9<sup>ου</sup> φύλλου έως τη συγκομιδή που οι περισσότεροι καρποί έχουν χρωματιστεί. (BBCH 20-89). Μέχρι 2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.

**Πιπεριά (Α), Μελιτζάνα (Α):** Για Αλτερναρίωση (*Alternaria solani*), Κλαδοσπορίωση (*Fulvia fulva*) 100 κ.εκ./στρέμα (max) ή 100 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/στρέμα. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 20-89). Μέχρι 2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.

**Πιπεριά (Θ), Μελιτζάνα (Θ):** Για Ωδίο (*Leveillula taurica*, *Erysiphe lycopersici*, *Oidium lycopersici*), Αλτερναρίωση (*Alternaria solani*), Κλαδοσπορίωση (*Fulvia fulva*) 100 κ.εκ./στρέμα (max) ή 100 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/στρέμα. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών (BBCH 20-89). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες.