

L1077654 GREC/6Z PPE4143818

 **Touchdown Premium**[®]
36 SL

syngenta[®]

GROUP 9 HERBICIDE

glyphosate (ομάδα φωσφονογλυκινών)

Πυκνό διάλυμα (SL)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

Παλιός: 7804/Νέος: 70424

Ημερομηνία χορήγησης: 08.12.2006

Ημερομηνία 1^η ανανέωσης: 02.07.2021

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

glyphosate (υπό μορφή
αμμωνιακού άλατος): 36 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 70,1 % β/β

**Μεταφωτρωτικό διασυστηματικό
μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για
την καταπολέμηση ετησίων
και ποθυετών αγρωστωδών
και πλατύφυλλων ζιζανίων.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49

Τηλ.: 210 6666612-13 - www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3



- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

5 lt e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. • Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό. • Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν δεν αναπνέει κανονικά ή καθόλου, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός επιμένει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας και την περιοχή κάτω από τα βλέφαρα με πολύ νερό για 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους. Επισκεφτείτε αμέσως γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους για τις εφαρμογές από 500 – 750 κ.εκ. να αφήσετε μία ασφάλιστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 75%.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης: Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Απορροφάται από το φύλλωμα των ζιζανίων και μεταφέρεται γρήγορα σε ολόκληρο το φυτό. Στο βιοχημικό επίπεδο εμποδίζει την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό/στρ. χωρίς να έρθουν σε επαφή τα σταγονίδια με τα διάφορα μέρη των καλλιεργειών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από τη ζέση, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Φάσμα δράσης:

Αγροί μετά την συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά: •Για τα Ετήσια αγρωστώδη και πλατυφύλλα ζιζάνια με δόση 150-200 κ.εκ.οκ./ στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρ. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στη ζωνή βλάστηση. •Για τα Πολυετή αγρωστώδη και πλατυφύλλα ζιζάνια και για την Κύπερη (*Cyperus sp.*) με δόση 500-600 κ.εκ.οκ./ στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρ. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνησση, κατά την άνησση ή λίγο μετά από αυτή. •Για τον Βέλιουρα (*Sorghum halepense*) με δόση 500 κ.εκ.οκ./ στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρ. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνησση, κατά την άνησση ή λίγο μετά από αυτή. •Για την Αγριάδα (*Cynodon dactylon*) και την Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*) με δόση 600 κ.εκ.οκ./ στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρ. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνησση, κατά την άνησση ή λίγο μετά από αυτή.

Ακαλλιέργητες εκτάσεις: •Για τα Ετήσια αγρωστώδη και πλατυφύλλα ζιζάνια με δόση 150-200 κ.εκ.οκ./ στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρ. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στη ζωνή βλάστηση. •Για τα Πολυετή αγρωστώδη και πλατυφύλλα ζιζάνια με δόση 500-600 κ.εκ.οκ./ στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρ. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνησση, κατά την άνησση ή λίγο μετά από αυτή. •Για τα Ευλώδη θάμνους, δέντρα, βάτα κλπ με δόση 600 κ.εκ.οκ./ στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρ. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνησση ή κατά την άνησση.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά), Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ Φρουτ, Κίτρα), Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες), Ελιές (ελαιοποιήσιμες και επιτραπέζιες συγκομιζόμενες μόνο από το δένδρο): •Για τα Ετήσια αγρωστώδη και πλατυφύλλα ζιζάνια με δόση 150-200 κ.εκ.οκ./ στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρ. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στη ζωνή βλάστηση. •Για τα Πολυετή αγρωστώδη και πλατυφύλλα ζιζάνια και για την Κύπερη (*Cyperus sp.*) με δόση 500-750 κ.εκ.οκ./ στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρ. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνησση, κατά την άνησση ή λίγο μετά από αυτή. •Για τον Βέλιουρα (*Sorghum halepense*) με δόση 500 κ.εκ.οκ./ στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρ. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνησση, κατά την άνησση ή λίγο μετά από αυτή. •Για την Αγριάδα (*Cynodon dactylon*) και την Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*) με δόση 750 κ.εκ.οκ./ στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρ. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνησση, κατά την άνησση ή λίγο μετά από αυτή.

Παρατηρήσεις: 1. Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15 – 30 εκατοστά.

2. Στις πολυετείς καλλιέργειες ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος, αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένες καλλιέργειες από το δεύτερο (2^ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.

3. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δέντρο. Δεν επιτρέπεται εφαρμογή στις περσέες στο έδαφος ελιές.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Γκρέιπ Φρουτ, Κίτρι, Αμπέλι (Επιτραπέζια σταφύλια και Οινοποιήσιμα σταφύλια), Ελιές (ελαιοποιήσιμες και επιτραπέζιες): 7 ημέρες., Αγροί μετά την συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά, Ακαλλιέργητες εκτάσεις: ---

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβατολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: •Να χρησιμοποιείτε κατάλληλες γεωργικές τεχνικές ώστε το σκεύασμα ή το ψεκασμένο έδαφος να μην έρχεται σε επαφή με τη διάφορα μέρη (καρπού, φύλλωμα, βλαστοί, κορμοί κ.α.) των καλλιεργειών και ιδιαίτερα των πυρηνόκαρπων. •Δεν επιτρέπεται η βόσκηση ψεκασμένων ζιζανίων. •Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. •Δεν επιτρέπεται ο ψεκασμός με χρήση χειροκίνητων ψεκαστήρων για τις εφαρμογές σε ακαλλιέργητες εκτάσεις και αντιστα μετά την συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία glyphosate, ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 9 (πρώην G) κατά HRAC. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία του σκευάσματος.

Χρονική διάσταση ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- **σποράς ή φύτευσης των καλλιεργιών που ακολουθούν:** Αφήστε να περάσουν μετά τον ψεκασμό τουλάχιστον επτά (7) ημέρες για τα ετήσια ζιζάνια ή δεκατέσσερις (14) ημέρες για τα πολυετή ζιζάνια πριν από την κατεργασία του εδάφους ή την επαναφύτευση.
- **της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Συνδυαστικότητα: --

