

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμού/ εκνεφώματα. • Διάθεση περιεκτικού/ περιεκτικότητας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Φοράτε ολόκληρο φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά τον ψεκασμό. • Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή κατά την ανάμιξη και φόρτωση. • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, να φοράτε μακρύ παντελόνι, μακριμάνικη μπλούζα και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη, την οσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για 15 λεπτά αφαιρέστε τους φακούς επαφής και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμπίσιμα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό.

Αν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα ρούχα με νερό πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ζαλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ: 210 7793777

Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα στις καλλιέργειες των ασηπών και του αρροβοίτου.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το AMISTAR 25 SC είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών, είναι προστατευτικό με μη διεσπαστική δράση που απορροφάει τη δράση του στο στάδιο της ανάπτυξης του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Ρύζι: Για Πυρικοκλάρια (*Pyricularia oryzae*), Ελμυθοσπόρια (*Helminthosporium oryzae*) με δόση 100 κ.ε.κ.κ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.

Ψεκασμοί φυλλώματος. Από την έναρξη της έκπτυξης του φυλλώματος σημείας έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 45-61). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται από την έναρξη της έκπτυξης του φυλλώματος σημείας έως την έναρξη της έκπτυξης της ταξιανθίας (BBCH 45-51), και η δεύτερη εφαρμογή εάν κρίνεται απαραίτητη από το στάδιο όπου το 70% της ταξιανθίας έχει εμφανισθεί έως και την έναρξη της άνθησης (BBCH 57-61). Στάρι, Τριτοκάλι, Σικάλη: Για Σειπορίαση (*Septoria tritici*), Σκαρώλια (*Puccinia triticulturae*) με δόση 60-100 κ.ε.κ.κ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-30 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της επιμικκυνσης του στελέχους έως το τέλος της άνθησης (BBCH 30-63). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Βρώμη, Κριθάρι: Για Σειπορίαση (*Septoria tritici*), Σκαρώλια (*Puccinia triticulturae*) με δόση 60-100 κ.ε.κ.κ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-30 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της επιμικκυνσης του στελέχους έως την πλήρη έκπτυξη του στάχους (BBCH 30-59). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Αραβόσιτος (για ενσίρωση και για παραγωγή σπόρων): Για *Setosphaeria turcica* με δόση 100 κ.ε.κ.κ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-30 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της άνθησης (BBCH 61) και 21 ημέρες μετά. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται.



Amistar®

25 SC

syngenta.

GROUP 11 FUNGICIDE

Azoxystrobin (χημική ομάδα στρομπιλουρινών)

Πυκνό εναίωρημα (SC)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60686/14.06.2018

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Azoxystrobin 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 76,4 % β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49

Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Πού τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Περιέχει 1,2-benzisothiazolol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

1 lt e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME and the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Ρύζι: 28 ημέρες.

Στάρι, Τριτοκάλι, Βρώμη, Σικάλη, Κριθάρι: 35 ημέρες.

Αραβόσιτος: ----.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Διαστέτετε τα ψεκαστικά όπλα. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο σφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση κατάλληλου μηχανισμού ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκησιστεί:

- Μην ψεκάζετε όταν το έδαφος είναι παγωμένο ή ξηρό.
- Προσοχή κατά την εφαρμογή όταν η διηληνή καλλιέργεια είναι μηλιά, δαμοκωνιά, κερσιά.
- Στην καλλιέργεια του ρυζιού να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άργιλο μικρότερη από 30%.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 2 ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Εφαρμόστε το AMISTAR 25 SC σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτή των στρομπιλουρινών (QoIs) με τα οποία δεν εμφανίζεται διασυστηματική ανθεκτικότητα.
- Εφαρμόστε το AMISTAR 25 SC προληπτικά και σε πρώιμο στάδιο της ανθοειας, αποφεύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

Χρονική διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες φάσης. Το AMISTAR 25 SC, είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην χρησιμοποιείτε το AMISTAR 25 SC, για εφαρμογές στις μηλιές ή όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γεωτονική καλλιέργεια μηλιάς. Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το AMISTAR 25 SC, να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

