

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυσιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Φοράτε μακρομάνικο πουκάμισο, μακριά παντελόνι και γάντια κατά την ανάπτυξη/φόρτωση, εφαρμογή του σκευάσματος και τη συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής. • Σε περίπτωση επανεπίδησης στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακριά παντελόνι και μακρομάνικο μπλουζάκι.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΗΣΗΣ:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλύνετε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός επιμένει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείται. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210 7793777.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκέυασμα ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής του προϊόντος κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης ή τους δρόμους.

- Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφίνεται:
- μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά νερά ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων και της χειμερινής ελαιοκράμβης.
 - μια απέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά νερά για την καλλιέργεια του ηλιανθού.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει 1,2- benzisothiazolol -3-one.

Τρόπος δράσης: Το Amistar Gold 12.5/12.5 SC είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών σε ζαχαρότευτλα, ηλιανθό και χειμερινή ελαιοκράμβη. Περιέχει τα δραστικά συστατικά azoxystrobin και difenoconazole. Η δ.ο. azoxystrobin (κωδικός FRAC: C3) είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο και μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική κυρίως δράση της ομάδας των στρομπίθουρινών. Με διασυστηματική κυρίως κίνηση δρα αναστέλλοντας την μιτοχονδριακή αναπνοή του μύκητα επηρεάζοντας την βλάστηση των спорίων. Η δ.ο. difenoconazole (κωδικός FRAC: C1) είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο ευρέος φάσματος της ομάδας των τριαζολών, με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Με ακροεταλή κυρίως κίνηση, δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση των στερολών στις κυτταρικές μεμβράνες επηρεάζοντας την επιμήκυνση του μυκηλίου.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο σπρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.



Amistar® Gold

12.5/12.5 SC

syngenta.

GROUP 11/3 FUNGICIDES

ΠΡΟΣΟΧΗ

UFI: 5TC4-10MH-D00R-J9QP

Azoxystrobin (Χημική Ομάδα στρομπίθουρινών)
Difenoconazole (Χημική Ομάδα τριαζολών DMIs)

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60898/14.10.2019

ΕΓΓΥΣΤΗΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Azoxystrobin 12,5% β/ο
Difenoconazole 12,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 76% β/β

Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Πε. Θ. Ξινόυ, Τηλ.: 231 0796940-3



- Επιδραβές σε περίπτωση κατάσχεσης.
- Επιδραβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Ποιύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Φάσμα δράσης: Ζαχαρότευτλα για Κερκοσπορίαση (Cercospora beticola), Έκρωριαση (Uromyces betae), Ψίδιο (Erysiphe betae), Ραμουλιάρια (Ramularia beticola) με δόση 100 κ.ε.κ.κ./στρέμμα (max) και με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός Φυλλώματος. Από το στάδιο όπου η καλλιέργεια με τα φύλλα της έχει καλύψει το 90 % της επιφάνειας του εδάφους έως όπου η ρίζα έχει φθάσει στο συγκομιζόμενο μέγεθος της (BBCH 39-49) (μέχρι 35 ημέρες πριν τη συγκομιδή). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 21 ημέρες. **Ηλιανθος:** για Σκληροτίνια (Sclerotinia sclerotiorum), Φόμα (Leptosphaeria lindquistii), Φώμοψη (Diaporthe helianthi) με δόση 100 κ.ε.κ.κ./στρέμμα (max) και με όγκο ψεκ. υγρού 20-60 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός Φυλλώματος. Κατόπιν της εμφάνισης όλων των φύλλων μέχρι τον διαχωρισμό της ταξιανθίας από το τελευταίο (ή νεότερο) φύλλο (BBCH 20-55). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 21 ημέρες. **Χειμερινή Ελαιοκράμβη (Χρήσιμης ουσίας):** για Χρήσιμης ουσίας σημάσιας: Σκληροτίνια (Sclerotinia sclerotiorum*), Φόμα (Leptosphaeria maculans*) με δόση 100 κ.ε.κ.κ./στρέμμα (max) και με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός Φυλλώματος. Από την έκπτυξη του 4^{ου} φύλλου έως το τέλος της άνθησης (BBCH 14-69). 2 εφαρμογές. Η πρώτη εφαρμογή να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο από την έκπτυξη του 4^{ου} φύλλου (από BBCH 14) και η δεύτερη εφαρμογή την άνοιξη από την εμφάνιση του 1^{ου} εμφανώς εκτεταμένου μεσογονάτιου διαστήματος (από BBCH 31).

Παρατηρήσεις: * Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της χειμερινής ελαιοκράμβης από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Τελευταία επίμβαση πριν τη συγκομιδή: Ζαχαρότευτλα: 35 ημέρες. Ηλιανθος: 60 ημέρες. Χειμερινή Ελαιοκράμβη: Δεν ορίζεται (καλύπτεται από την καλλιερπητική περίοδο μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλή Ξέπλυμα (τα νερά του Ξέπλυντος το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριμπή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοτύγιες ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκέυασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποβληθεί: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας: Όταν εφαρμόζεται το σκέυασμα σε ζαχαρότευτλα για την καταπολέμηση της κερκοσπορίασης (Cercospora beticola) και του ψιδίου (Erysiphe betae), να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης προς αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκέυασμα: Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

Φυτοτοξικότητα: Το σκέυασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Το σκέυασμα είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην χρησιμοποιείτε το σκέυασμα για εφαρμογές στις μηλιές ή όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιών. Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το σκέυασμα να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιών.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του καλά κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.



L1088245 GREC/04A PPE4160159

L1088245 GREC/04A PPE4160159

1 l e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME and the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company