

 **Carial<sup>®</sup> Flex**

**syngenta.**

**GROUP 40 | 27 FUNGICIDES**

**UFI: CDNR-Y57E-3001-SWDW**

*Mandipropamid (Χημική ομάδα αμίδια οργανικών οξέων)  
Cymoxanil (Χημική ομάδα ακεταμίδια)*

**Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)**

**Μυκητοκτόνο με προληπτική δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου στην πατάτα.**

**250 gr e**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):  
60492/04-01-2016

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**

**Mandipropamid 25,0% β/β  
Cymoxanil 18,0% β/β  
Βοηθητικές ουσίες 54,5% β/β**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ  
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:**

**Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ**  
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49  
Τηλ.: 210 6666612-13 [www.syngenta.gr](http://www.syngenta.gr)  
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3



**ΠΡΟΣΟΧΗ**



- **Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.**
- **Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.**
- **Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <αίμα, θυμός αδένας> μετά από επανειλημμένη έκθεση ή παρατεταμένη έκθεση.**
- **Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

#### **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην αναπνέετε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Κατά την ανάμιξη και φόρτωση να φοράτε προστατευτική ενδυμασία (ολόσωμη φόρμα και μπότες), γάντια και γυαλιά. • Κατά την εφαρμογή να φοράτε γάντια και γυαλιά. Αν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ με καμπίνα να φοράτε γάντια. • Σε περίπτωση επανεισόδου οι εργάτες να φοράνε γάντια και φόρμα εργασίας.

#### **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

**Γενικά:** Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Εισπνοή:** Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.

**Επαφή με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα άμεσα. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύντε τα ρούχα πριν ξαναφορεθούν.

**Επαφή με τα μάτια:** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

**Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**

**Περιέχει κυτοχανil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.**

**Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήνετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά νερά.**

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Μυκητοκτόνο με προληπτική δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου στην πατάτα. Περιέχει τις δραστικές ουσίες mandipropamid και cytochanil. Η δραστική ουσία mandipropamid παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση εμφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση. Η δραστική ουσία cytochanil εμφανίζει προληπτική και θεραπευτική δράση.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος.

**Προετοιμασία του διαλύματος:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα πριν τη χρήση. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Αναδεύετε και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

**Φάσμα δράσης:**

**Πατάτα:** Για Περονόσπορο (*Phytophthora infestans*) 60 γρ. σκευάσμ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 20-60 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος (BBCH 31-89).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 6 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πατάτα: 21 ημέρες.**

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Να χρησιμοποιείται προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 6 ώρες.**

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος.