

L1094739 SEQUESTRENE 10 kg (2X5kg) GREC/09A



UFI: 8UG5-J07G-C00N-EKG0

**ΤΥΠΟΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)**

**ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ**

**NK Ανόργανο λίπασμα με μικρο-θρεπτικά συστατικά, 3-15**

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ**

**Ολικό άζωτο (N): 3,0 %**

**Άζωτο (N) από ουρία: 3,0 %**

**Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O): 15,0 %**

**Υδατοδιαλυτός Σίδηρος (Fe): 6,0 %**

**Χηλικός σίδηρος (Fe): 5,5 %**

**Ως χηλικό σύμπλοκο με EDDHA**

**Ιο,ρ] EDDHA 1,5-2,3 % (AVG 1,9 %)**

**Ιο,ο] EDDHA 2,6-3,4 % (AVG 3,0 %)**

**pH σταθερότητας χηλικού σιδήρου Ιο,ο] EDDHA και Ιο,ρ] EDDHA: 4 – 11**

**Κοκκομετρία: Κοκκία. > 99% του προϊόντος περνά από κόσκινο 8 mm**

**ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**

**EDDHA NaFe CAS 84539-55-9 (CMC 1), οξείδιο του καλίου CAS 12136-45-7 (CMC 1),**

**ουρία CAS 57-13-6 (CMC 1)**

**CMC 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών**

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Crop Protection AG – Rosentalstrasse 67, Basel (Switzerland)**

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ- ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ**

**Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49**

**Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr**

**ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3**

**Ανασκευάστηκε από: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ**



• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

10 kg (2x5 kg) e

Product names marked ® or ™, the ALLNURCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ECON are trademarks of a Syngenta Group Company

**Δηλώσεις προφύλαξης:**  
**Πρόληψη:** • Αποφεύγετε να αναπνέετε τη σκόνη. • Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια.  
**Αντιμετώπιση:** • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. • Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
**Απόρριψη:** • Διάθεση του περιεχόμενου/ περιέκτη σε ειδικευμένη μονάδα διάθεσης απορριμμάτων.  
**Για την αποφυγή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, τηρήστε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης αυτού του προϊόντος λίπασμας. Περιέχει EDDHA NaFe.**

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ζεπνύετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό με τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε αμέσως γιατρό.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και πλύντε ποδιά καθά τα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και κρατήστε τον ζεστό και σε κατάσταση ανάπνοιας. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως το γιατρό και δείξτε του αυτό το δοχείο ή την ετικέτα, μην προκαλέσετε εμετό.  
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

**Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη προφύλαξη του χρήστη και του περιβάλλοντος:** • Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καννίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Αποφύγετε τη μόλυνση των επιφανειακών υδάτων. • Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας για ανάμιξη και εφαρμογή: γάντια, μακριμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι, μη διαπερατά υποδήματα. • Καθαρίζετε καλά τα δοχεία ανάμιξης και εφαρμογής του SEQUESTRENE. Είναι ελαφρά διαβρωτικά για τα μεταλλά αν μείνει για πολύ σ' επαφή μαζί τους. • Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας με πλάσι ή τριπλάσιο. Η χρήση τους για οποδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη. • Εφαρμογή στο έδαφος σύμφωνα με τις οδηγίες δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο για τα φυτά.

**Αυτό το λίπασμα περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να απελευθερώσει αμμωνία και να έχει αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης. Χρησιμοποιήστε το σε καλά αεριζόμενο χώρο σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευής.**

**ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**  
Το SEQUESTRENE 138 Fe NK 100 SG αντιμετωπίζει προληπτικά και θεραπευτικά τροφονεπείς σιδήρου για το αμείλι, τα εσπεριδοειδή, σπαρτώνες αλλά και μούρα, λαχανικά καθώς και καλλιπωστικά φυτά και δέντρα. Συνιστάται σε περίπτωση τροφονεπίας σιδήρου όταν εμφανίζεται χλωρώση και ως προληπτική εφαρμογή όπου οι χλωρώσεις σιδήρου είναι συνήθεις σε αλκαλικά και ασβεστολιχικά εδάφη (pH> 7). Το SEQUESTRENE 138 Fe NK 100 SG μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα προγράμματα λίπασμας για κατάλληλη προληπτική σφοδρικού σιδήρου.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Το SEQUESTRENE 138 Fe NK 100 SG μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη φύτευση ή κατά την ανάπτυξη των φυτών.

**Αντιμετώπιση τροφονεπικών σιδήρου**  
**Εφαρμόστε το SEQUESTRENE 138 Fe NK 100 SG όπως υποδεικνύεται παρακάτω:**  
**Αμείλι.** Κατά τη φύτευση: 5 γρ./φυτό. Ανενπτυγμένα πρεμνά: 20-50 γρ./πρέμνο με περίπου 10 κιλά νερό σε ανενπτυγμένη καλλιέργεια. Πυρηνόκαρπα (Ροδάκιο, Βερικόκο, Δαμάσκηνο, Κεράσι). Αναπτυγμένα δέντρα: 50-150γρ./δέντρο με 10-15 κιλά. Μήλοισι (Ακτιόδο, Μήλο, Κιάσι). Αναπτυγμένα δέντρα: 100-300 γρ./δέντρο με 10-15 κιλά νερό. Εσπεριδοειδή (Πορτοκιά, Μανταρίνι, Κίλυμνησι, Λεμόνι, Γκράιφρουσι). Δέντρα μικρής ανάπτυξης: 50-100 γρ./ δέντρο. Δέντρα μέτριας ανάπτυξης: 100-150 γρ./δέντρο. Δέντρα μεγάλης ανάπτυξης: 150-200 γρ./δέντρο. Η εφαρμογή γίνεται με 10-25 λίτρα νερού και άμεση ενσωμάτωση. **Ελιά.** Δέντρα μικρής ανάπτυξης: 5-20 γρ./δέντρο. Δέντρα μέτριας ανάπτυξης: 20-50 γρ./δέντρο. Δέντρα μεγάλης ανάπτυξης: 60-100 γρ./δέντρο. **Αβοκάντο & Μπανάνια.** Θάμνοι & νεαρά δέντρα: 50-100 γρ./δέντρο. Αναπτυγμένα δέντρα: 100-300γρ./δέντρο. **Ακρόβια (Φασίτι, Αμυγδαλιά, Κόκκινο, Καρούι, Φουντούκι).** Δέντρα μικρής ανάπτυξης: 5-20 γρ./δέντρο. Δέντρα μέτριας ανάπτυξης: 20-50 γρ./δέντρο. Δέντρα μεγάλης ανάπτυξης: 60-100 γρ./δέντρο. **Φυτώρια δέντρων.** Γενική οδηγία: 5-8 γρ./δενδρύλλιο. Η εφαρμογή γίνεται με 10-25 λίτρα νερού και άμεση ενσωμάτωση. **Καλλιπωστικά -Ανθοκομικά (Γαρδένια, Χρυσάνθεμα, Μπιγκόνια κ.α.)** Γενική οδηγία σε γλάστρες: Διάλυμα προϊόντος 1γρ/ κιλό νερού. Σε βαριά προσβολή επαναλάβετε μετά από 8 ημέρες. **Όρτανια.** Γενική οδηγία σε γλάστρες: Διάλυμα προϊόντος 5γρ/ κιλό νερού. Σε βαριά προσβολή επαναλάβετε μετά από 8 ημέρες. **Τρανταφυλλία.** Γενική οδηγία: 3 5γρ./φυτό ή 10-12γρ/τμ. Κοβολικά. **Καλλιπωστικά θάμνοι (αζαλέες, ροδόδεντρα, ορταναίες).** Γενική οδηγία:10-20γρ./φυτό. Με το νερό ποτίσματος. **Καλλιπωστικά δέντρα.** Γενική οδηγία:50-100γρ/φυτό. Με το νερό ποτίσματος.

**Αραχίδα.** Γενική οδηγία: Διάλυμα 5% του προϊόντος. Εφαρμογή με φυλλώψεκασμό. 1-2 εφαρμογές. **Λαχανικά.** Γενική οδηγία: 50-100γρ. διαλύματος 2% (2γρ./κιλό νερού). Εφαρμογή με ριζοπάση και με φυλλώψεκασμό. **Μούρα.** Φυτά μικρής ανάπτυξης: 0,5-0,7 γρ/φυτό. Αναπτυγμένα φυτά: 1-1,5 γρ/φυτό. Εφαρμογή με ριζοπάση και με φυλλώψεκασμό. **Φρούδια.** Κατά τη φύτευση: 0,5-0,7 γρ/φυτό. Ανενπτυγμένα φυτά: 1-1,5 γρ/φυτό. Εφαρμογή με ριζοπάση και με φυλλώψεκασμό. **Πατάτα.** Γενική οδηγία: 50-100γρ. διαλύματος 2% (2γρ./κιλό νερού). Εφαρμογή με φυλλώψεκασμό.

Σε περίπτωση σοβαρής χλωρώσης επαναλάβετε τη θεραπεία με χαμηλότερη δόση 2 μήνες αργότερα. Ο αριθμός των εφαρμογών θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα της ανεπάρκειας, αλλά θα πρέπει να διατηρείται εντός του εύρους που συνιστάται παρακάτω: •Στις δενδρόδεις καλλιέργειες, ο γενικός κανόνας είναι να εφαρμόζονται 3-5 γ ανά δέντρο για κάθε επί διαμέτρου κορμού αλλά να μην εφαρμόζεται περισσότερο από 0,5 kg ανά δέντρο. Αυτό ισχύει για τα έντονα κίτρινα δέντρα. Σε περίπτωση ήπιότερης σοβαρής χλωρώσης, μειώστε το ποσό κατά 30-40%. •Οι μικρές δόσεις είναι για μικρά φυτά, χλωρώσεις ελαφριάς μορφής ή για προληπτικές εφαρμογές και για ποδή διαπερατά εδάφη.

**Χρόνος εφαρμογής:** •Φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα έλλειψης σιδήρου: εφαρμόστε το SEQUESTRENE 138 Fe NK 100 SG οποιαδήποτε στιγμή. Συνιστάται αρχικά η θεραπεία των χλωρωτικών φυτών για να βεβαιωθείτε ότι η χλωρώση προέρχεται από έλλειψη σιδήρου. •**Προληπτικές εφαρμογές:** Όσον αφορά τις δενδρόδεις καλλιέργειες εφαρμόστε το SEQUESTRENE 138 Fe NK 100 SG νωρίς την άνοιξη, είτε πριν είτε κατά την ανάπτυξη της νέας βλάστησης. Έτσι, το χηλικό άλας διατίθεται πριν από την έναρξη της βλαστικής ανάπτυξης και τα φυτά εφοδιάζονται με παροχή σιδήρου στον βέλτιστο χρόνο. •Φυτά που δεν παρουσιάζουν εμφανή συμπτώματα έλλειψης σιδήρου: Εφαρμόστε το SEQUESTRENE 138 Fe NK 100 SG ως διεγερτικό ανάπτυξης/λίπασμα σιδήρου για τόνωση της ανάπτυξης και αύξησης της παραγωγής. Καθολική εφαρμογή ή εφαρμογή με απευθείας προσθήκη στο νερό άρδευσης, π.χ. άρδευση με καταιονισμό.

**Τεχνική / παρήμετρο εφαρμογής:** Το SEQUESTRENE 138 Fe NK 100 SG μπορεί να εφαρμοστεί αδιάλυτο ή ως ψεκαστικό υγρό. Είναι πλήρως υδατοδιαλυτό. Μπορεί να αναμειχθεί με διαλύματα λίπασμάτων. **Πολυτετές καλλιέργειες**

- Διαβροχή μέσα από τις γραμμές άρδευσης γύρω από τα δέντρα
- Άμεση έκχυση στο έδαφος, 3 εγκυώσεις ανά τμ2 από αντίλη υψηλής πίεσης εντός της γραμμής άρδευσης
- Καθολική ενσωμάτωση στο έδαφος ή χωρίς ενσωμάτωση υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει βροχή εντός 10 -5 ημερών
- Απευθείας προσθήκη στο νερό άρδευσης, π.χ. για άρδευση με καταιονισμό. (Δείτε ειδικές οδηγίες)
- Εμβάπτιση του ριζικού συστήματος των φυτών σε γλάστρα ή κατά τη μεταμότευση σε διάλυμα SEQUESTRENE 0,1%.
- Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με διάλυμα 0,1% επί του στέμψου ψεκασμού **Επίσης καλλιέργειες:**
- Καθολική ή επί των γραμμών φύτευσης εφαρμογή με ή χωρίς λίπασμα
- Άμεση προσθήκη στο νερό άρδευσης
- Συμπληρωματική λίπασμα
- Διαφυλλικός ψεκασμός (ΜΗΝ ξεπερνάτε το 0,2 %)

Να χρησιμοποιείται μόνο όπου υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη. Μην υπερβείτε τον αριθμό εφαρμογών. Εργαστείτε και εργαστείτε καλά. Επικοινωνήστε με την εταιρεία SYNGENTA HELLAS Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. για πιο συγκεκριμένες συστάσεις. Δικτυακός τόπος [www.syngenta.gr](http://www.syngenta.gr)

Οι δόσεις αυτού του προϊόντος αποτελούν συστάσεις.

Συνιστούμε στους παραγωγούς να ζητήσουν συμβουλές από τον σύμβουλό τους ώστε να προσαρμόσουν τις οδηγίες στις ανάγκες των καλλιεργειών τους και να αποφύγουν την υπερβολική λίπασμα.

Μην αναμειγνύετε με προϊόντα που περιέχουν χαλκό, προϊόντα που περιέχουν μόλυβδο, εντομοκτόνα ή μυκητοκτόνα. Μπορεί να αναμειχθεί με διαλύματα λίπασμάτων και διαλύματα που περιέχουν διαλυτά άφωσφορικά άλατα.

Σε περίπτωση συμβολίων, εκτελέστε μια μικρή κλίμακα δοκιμή φυσικής συμβατότητας με τα διάφορα προϊόντα που ακολουθείτε να αναμειχθείτε.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Διατηρείται τα δοχεία ερμητικά κλεισμένα σε Ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

**Ημερομηνία παραγωγής - παρτίδας παραγωγής:** Ανατρέξτε στη συσκευασία.



L1094739 SEQUESTRENE 10 kg (2X5kg) GREC/09A



UFI: 8UG5-J07G-C00N-EKG0

**ΤΥΠΟΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)**

**ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ**

**NK Ανόργανο λίπασμα με μικρο-θρεπτικά συστατικά, 3-15**

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ**

**Ολικό άζωτο (N): 3,0 %**

**Άζωτο (N) από ουρία: 3,0 %**

**Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O): 15,0 %**

**Υδατοδιαλυτός Σίδηρος (Fe): 6,0 %**

**Χηλικός σίδηρος (Fe): 5,5 %**

**Ως χηλικό σύμπλοκο με EDDHA**

**Ιο,ρ] EDDHA 1,5-2,3 % (AVG 1,9 %)**

**Ιο,ο] EDDHA 2,6-3,4 % (AVG 3,0 %)**

**pH σταθερότητας χηλικού σιδήρου Ιο,ο] EDDHA και Ιο,ρ] EDDHA: 4 – 11**

**Κοκκομετρία: Κοκκία. > 99% του προϊόντος περνά από κόσκινο 8 mm**

**ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**

**EDDHA NaFe CAS 84539-55-9 (CMC 1), οξείδιο του καλίου CAS 12136-45-7 (CMC 1),**

**ουρία CAS 57-13-6 (CMC 1)**

**CMC 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών**

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Crop Protection AG – Rosentalstrasse 67, Basel (Switzerland)**

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ- ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ**

**Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49**

**Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr**

**ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3**

**Ανασκευάστηκε από: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ**



• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

10 kg (2x5 kg) e

Product names marked ® or ™, the ALLNURCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ECON are trademarks of a Syngenta Group Company