

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην αναπνέετε σταγονίδια/ ατμούς. • Μην τρώτε, πίνετε ή καννίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/ φόρτωσης και κατά την εφαρμογή. • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας. • Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

## ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

**Γενικές οδηγίες:** Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα άμεσα. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύντε τα ρούχα πριν ξαναφορεθούν.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Μην προκαλείτε εμετό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

## ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρωτές επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μια ασφάλιστη ζώνη 5 μέτρων από τα επιφανειακά νερά.

Για να αποφυγείτε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Περιέχει trinexarac-ethyl.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Προετοιμασία του διαλύματος: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύουμε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.



# Moddus<sup>®</sup> Evo

250 DC

syngenta.

UFI: YC86-70C8-9008-P44P

Trinexarac-ethyl (Χημική Ομάδα PGRs)

### Εναιωρηματοποίηση συμπύκνωμα (DC)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):  
8262/06-12-2016

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**

Trinexarac-Ethyl 25 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 74,38 % β/β

### Ρυθμιστής ανάπτυξης για την αποφυγή του πληγαγίσματος σε σιτηρά.

### ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

### Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49  
Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr  
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σινδός, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked © or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

# 1 l t e

## ΠΡΟΣΟΧΗ



- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε όργανα (νευρικό σύστημα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Προφύλαξη για τους χειριστές: Φοράτε γάντια νιτρίλιο, κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό με μακριά μανίκια κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων προετοιμασίας και χρήσης του σκευάσματος.

**Φάσμα δράσης: Μαλακό χειμερινό Σιτάρι, Μαλακό Ανοιξιάτικο σιτάρι, Σκληρό Σιτάρι:** Για Περιορισμό Ανάπτυξης-Παραμείωση πηγαγίσματος 40 κ.ε.κ.κ./στρ.(max). Όγκ.ψεκ.υγρ.: 10-40 λίτ./στρ. Από το στάδιο όπου 5 αδελφία είναι ορατά έως την πλήρη εμφάνιση του φυλλώου σημεία (BBCH 25-39). Μία εφαρμογή. **Χειμερινό Κριθάρι:** Για Περιορισμό Ανάπτυξης-Παραμείωση πηγαγίσματος 60 κ.ε.κ.κ./στρ.(max). Όγκ.ψεκ.υγρ.: 10-40 λίτ./στρ. Από το στάδιο όπου 5 αδελφία είναι ορατά έως την πλήρη εμφάνιση του φυλλώου σημεία (BBCH 25-39). Μία εφαρμογή. **Ανοιξιάτικο Κριθάρι:** Για Περιορισμό Ανάπτυξης-Παραμείωση πηγαγίσματος 50 κ.ε.κ.κ./στρ.(max). Όγκ.ψεκ.υγρ.: 10-40 λίτ./στρ. Από το στάδιο όπου 5 αδελφία είναι ορατά έως την πλήρη εμφάνιση του φυλλώου σημεία (BBCH 25-39). Μία εφαρμογή. **Σίκαλη:** Για Περιορισμό Ανάπτυξης-Παραμείωση πηγαγίσματος 50 κ.ε.κ.κ./στρ.(max). Όγκ.ψεκ.υγρ.: 10-40 λίτ./στρ. Από το στάδιο όπου 5 αδελφία είναι ορατά έως την πλήρη εμφάνιση του φυλλώου σημεία (BBCH 25-39). Μία εφαρμογή.

**Ζέα (σπελτέ, ντίνικελ):** Για Περιορισμό Ανάπτυξης-Παραμείωση πηγαγίσματος 40 κ.ε.κ.κ./στρ.(max). Όγκ.ψεκ.υγρ.: 10-40 λίτ./στρ. Από το στάδιο όπου 5 αδελφία είναι ορατά έως την πλήρη εμφάνιση του φυλλώου σημεία (BBCH 25-39). Μία εφαρμογή. **Κτηνοτροφικά ψυχανθή (για παραγωγή σπόρου):** Για Περιορισμό Ανάπτυξης-Παραμείωση πηγαγίσματος 50 κ.ε.κ.κ./στρ.(max). Όγκ.ψεκ.υγρ.: 10-40 λίτ./στρ. Από το στάδιο σχηματισμού του 1ου κόμβου / 1 εκατοστό πάνω από το σημείο αδεφώματος έως την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής (BBCH 31-51). Μία εφαρμογή. **Γρασιδί (για παραγωγή σπόρου):** Για Περιορισμό Ανάπτυξης-Παραμείωση πηγαγίσματος 60 κ.ε.κ.κ./στρ.(max). Όγκ.ψεκ.υγρ.: 10-40 λίτ./στρ. Από το στάδιο σχηματισμού του 1ου κόμβου / 1 εκατοστό πάνω από το σημείο αδεφώματος έως την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής (BBCH 31-51). Μία εφαρμογή.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μαλακό χειμερινό Σιτάρι, Μαλακό ανοιξιάτικο σιτάρι, Σκληρό σιτάρι, Χειμερινό Κριθάρι, Ανοιξιάτικο Κριθάρι, Σίκαλη, Ζέα (σπελτέ, ντίνικελ), Κτηνοτροφικά ψυχανθή (για παραγωγή σπόρου) Γρασιδί (για παραγωγή σπόρου): Δεν ορίζεται.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μηχ. να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξεπλύση (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην εισέρχεστε πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Να εφαρμόζεται σε φυτά που δεν βρίσκονται κάτω από συνθήκες στρες και όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι δυσμενείς.

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος.

