

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό. • Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο. • Διάθεση του περιεχομένου/ περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την αλληγή των φυαίων του σκευάσματος στο μηχανήμα εφαρμογής και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικές οδηγίες: Να έχετε διαθέσιμο το δοχείο του σκευάσματος, την ετικέτα ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σε περίπτωση που απευθυνθείτε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων ή σε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν η αναπνοή είναι μη κανονική ή έχει σταματήσει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Διατηρήστε τον ζωστό και ζαηλωμένο. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το σκευάσμα ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκοιο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Να μην προκληθεί έμετος. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντιόδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντιόδοτο. Ακολουθήστε συμπωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΙΝΑ ΜΗΝ ΠΛΈΝΕΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΝΤΆ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΆ ΎΔΑΤΑ. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τους λιθοστρωτές επιφάνειες και τους δρόμους.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες: Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης να μην εφαρμόζετε κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Για την χρήση στα φοινικόδεντρα να απομακρύνετε τις ταξιανθίες πριν την άνθηση για τον χρόνο που γίνεται η εφαρμογή και για τον επόμενο.

Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης: Παρουσιάζει μετακίνηση από το ξύλωμα προς τα φύλλα. Δρα κυρίως με κατάποση. Προσδέεται στους υποδοχείς του γ- αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) και ενεργοποιεί το κανάλι ιόντων χλωρίου. Η συνεχής εισορή ιόντων χλωρίου στο μυϊκό ιστό οδηγεί στην παράλυση και τελικά το θάνατο των εντόμων.



GROUP 6 INSECTICIDE

UFI: NETW-9523-C00P-TSAQ

Emamectin benzoate (Ομάδα αβερμεκτινών)

Άλλες υγρές μορφές που εφαρμόζονται χωρίς διάλυση (AL)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14728/21.11.2019

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Emamectin benzoate 9.5 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 89,74 % β/β

Εντομοκτόνο για τον έλεγκο του κόκκινου ακαθαρίου στα φοινικόδεντρα.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49

Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδους, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e



Revive® II

syngenta

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Προκαλεί βλάβη στα όργανα.
- Προκαλεί βλάβη στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Τρόπος εφαρμογής: Εμβολιασμός κορμού. Μικρο-έγχυση στον κορμό του δένδρου με χρήση ειδικής συσκευής τύπου SYNGENTA TREE CARE, που ενδέχεται την εφαρμογή του σκευάσματος μέσω κλειστού συστήματος (χωρίς την έκθεση του χειριστή), μέσω απευθείας έγχυσης της προ-μετρημένης ποσότητας του σκευάσματος με χρήση αντλίας από ειδική λήκη με ακροφύσιο, μέσα σε βιοδιασπώμενη βαλβίδα εισορήσ που έχει τοποθετηθεί σε οπή, η οποία έχει ανοίξει στον κορμό του δένδρου (κλειστό σύστημα μεταφοράς).

Οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής:

- 1) Ανοίγετε με τρυπάνι κατάλληλης οπές στον κορμό. • Το βάθος της οπής πρέπει να είναι ίσο με το 1/3 της διαμέτρου του κορμού (15-30 εκ.). • Οι οπές έγχυσης πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 2 μέτρα κάτω από την στεφάνη των δένδρων. • Οι οπές έγχυσης να ανοίγονται σε διαφορετικά ύψη γύρω από τον κορμό. • Αποφεύγετε τις οπές κάτω από τραυματισμένους ιστούς ή παλιές οπές. • Οι οπές να έχουν όγκο, μεγαλύτερο από τον όγκο του σκευάσματος που θα εγχυθεί.
- 2) Στην οπή που έχει δημιουργηθεί τοποθετείται ειδική βαλβίδα εισορήσ που εμποδίζει την εκροή του υλικού. Η βαλβίδα παραμένει μετά το τέλος της εφαρμογής και για μεταγενέστερες εφαρμογές.
- 3) Η λήκη τοποθετείται στη βαλβίδα εισορήσ στη οποία θα γίνει η έγχυση. Η λήκη πιέζεται προς το δέντρο πριν ξεκινήσει η έγχυση.
- 4) Η ποσότητα που εγχέεται είναι σύμφωνα με το φάσμα δράσης.
- 5) Η λήκη αφαιρείται χωρίς να έχει σταγονίδια του σκευάσματος και η οπή κλείνεται μηχανικά, με ξύλινο καπάκι.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Εφαρμόζεται αδιάλυτο.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίστε σχολαστικά τον εξοπλισμό εφαρμογής. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το μηχανήμα εφαρμογής και όλα τα εξαρτήματα του, δυο-τρεις (2-3) φορές με μεθανόλη και στη συνέχεια με νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Φάσμα δράσης: Καθλιωστικά Φοινικοειδή: για Κόκκινο Σκαθάρι (Rhyacionia ferruginea) 21 κ.εκ.οκ./δένδρο. Εφαρμόζεται αδιάλυτο. Μία (1) εφαρμογή ανά έτος με μικρο-έγχυση κορμού μέσω οπών έγχυσης σε διάσταση ύψους >2.5 μ. Οι οπές έγχυσης ανοίγονται τουλάχιστον 2 μέτρα κάτω από τη βάση του νέο εμφανιζόμενου βλαστού. Χρόνος εφαρμογής: Κατά την περίοδο δραστηριότητας του εντόμου.

Παρατηρήσεις:

- 1) Για τα φοινικόδεντρα να ανοίγονται 2-4 οπές ανά δένδρο με 8 χιλ. διάμετρο και 15-30 εκ. βάθος (περίπου στο 1/3 της διαμέτρου του κορμού).
- 2) Η έγχυση ανά οπή να γίνεται μετά την τοποθέτηση βαλβίδων εισορήσ.
- 3) Η προβλεπόμενη χρήση αφορά σε φοινικόδεντρα μόνο στον αστικό ιστό.

Τελυταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μην εφαρμόσιμο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Το χρησιμοποιήτο μη αραιωμένο προϊόν και οι μολυσμένες μη εκπλυμένες συσκευασίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα και πρέπει να απορριπτόνται με ελεγχόμενη απόσφραξη ή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Σε περίπτωση μεγάλων ποσοτήτων ακριβοτιμολογούμενου προϊόντος, συμβουλευθείτε τον προμηθευτή.

Συνδυαστικότητα: Χαμηλά

Φυτοτοξικότητα: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλήθρηγες.

Χρόνικη σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.