



syngenta®

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
acibenzolar-s-methyl 50 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 48,5 % β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην
Αγορά (ΑΑΔΑ): 8325/12.04.2023

**Ενεργοποιητής της φυσικής
άμυνας του φυτού.**

60 gr e

L1102318 PPE4181291

GREC/04B

GROUP P01 FUNGICIDE

UFI: 4X31-A0M2-H008-960V

acibenzolar-s-methyl

(Χημική ομάδα βενζοθειαδιαζολικά)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Προορίζεται μόνο για
επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Syngenta
Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής,
153 49, Τηλ.: 210 6666612-13

www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος,
Τηλ.: 231 0796940-3

ΠΡΟΣΟΧΗ



Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME,
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

L1102318 GREC/04B PPE4181291

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. • Πλένετε το δέρμα σχολαστικά μετά τον χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο. • Φοράτε ορθόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος. • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε γάντια και ορθόσωμη φόρμα εργασίας. • Εφαρμογή μόνο με γεωργικό ελκυστήρα (τρακτέρ) και μπάρες – βραχίονες ψεκασμού. • Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικές οδηγίες: Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή τη συσκευασία του προϊόντος. Μην προκαλέσετε εμετό: περιέχει αποστάγματα πετρελαίου και/ή αρωματικούς διαλύτες.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Σε περίπτωση μη κανονικής αναπνοής ή διακοπής της, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Τρόπος δράσης: Το σκεύασμα είναι ενεργοποιητής της φυσικής άμυνας του φυτού. Περιέχει τη δ.ο. acibenzolar-s-methyl, η οποία δεν αναπτύσσει άμεση δράση στον παθογόνο παράγοντα αλλά ενεργοποιεί τους μηχανισμούς φυσικής άμυνας των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε πολλαπλές ασθένειες. Έχει προληπτική δράση και κινείται διασυστηματικά προστατεύοντας τη νέα βλάστηση. Απορροφάται γρήγορα από το φύλλωμα και κινείται με ακροπηταλική και βασιπηταλική κίνηση στο εσωτερικό του φυτού. Λόγω του ιδιαίτερου μηχανισμού δράσης του, το acibenzolar-s-methyl πρέπει να εφαρμόζεται προληπτικά.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος, με χρήση γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) και μπάρες - βραχίονες ψεκασμού. Η εφαρμογή να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση του ψεκαστικού υγρού.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/ διαλύματος εφαρμογής: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Φάσμα δράσης:

Τομάτα Υπαίθρου: Για *Pseudomonas syringae*, *Xanthomonas campestris* 2,5 – 5 γρ. σκ./στρέμμα με όγκο ψεκ. υγρού 20-80 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την εμφάνιση του πρώτου οφθαλμού έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών, όταν έχουν το τυπικό τους χρώμα (BBCH 51-89).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Τομάτα υπαίθρου: 3 ημέρες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία *acibenzolar-S-methyl*, η οποία ανήκει στην ομάδα P-01 κατά FRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται: • να εφαρμόζεται το σκεύασμα προληπτικά • να γίνεται εναλλαγή με άλλα σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης (διαφορετικής ομάδας κατά FRAC).

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα ψεκαστικά μηχανήματα διεξοδικά. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια.

Φυτοτοξικότητα: Συνίσταται να γίνεται μία δοκιμή σε μικρή κλίμακα, για την αποφυγή εμφάνισης συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας σε ευαίσθητες ποικιλίες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

