

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και εισίδρωσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Μπορεί να προκαλέσει υπηλπή ή ζάλη.
- Υποβίβει τη πρόσληψη θλασής στο έμβρυο.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Αποφύγετε να αναπνεύσετε ατμούς. • Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι προσεκτικά μετά το χειρισμό. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδυμασία, μέσα στομιακής προστασίας για τα μάτια, πρόσωπο. • Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την αναμείξη ή φθοραση και κατά την συντήρηση του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. • Λίθωση των περιεχομένου/ περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΑ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΗΝΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδύνατο. Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε ή Επικοινωνήστε γιατρό. Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΕΣΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στο καθαρό αέρα και καλύψτε τον να εκκελωθεί εμέτο. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ποτέ μην προκαλέτε εμέτο ή δίνετε αλόληση από το στόμα εάν το θυμά δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς. Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρήσει ερεθισμό του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επικοινωνήστε γιατρό. Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΕΣΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και καλύψτε τον να εκκελωθεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αν δεν υποκαίει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε ή Επικοινωνήστε γιατρό. Βγάλτε το μολύβι από το χέρι/πόδι και πλύντε τον να πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακούστε/ζητήστε αιματολογική θεράπεια. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΗΝΤΗΡ:** 210 7293777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Πλο μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακό υδάτινο / Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιπόλυτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να προστατέψετε τα υπήλυτα νερά, μην εφαρμόζετε το προϊόν το θνήσκοντα σε οπαρνορες και σε χλοοτάπητα. Εφαρμόστε στην επιδοκράμην μία φορά κάθε τρία χρόνια. Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αθόνετε μία αφέσκητη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη. Για να αποφύγετε κίνδυνογ για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτευτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο καταπολεμά ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Το σκευασμό περιέχει το δραστικό συστατικό cycloxydim, που ανήκει στη χημική ομάδα των κυκλοξείμων. Το cycloxydim απορροφάται από τα φύλλα και παρεμποδίζει το σχηματισμό των μεριστωματικών κυττάρων και την ανάπτυξη. Σε βροχίαιες, βροχίαιες περιουρήσεις την καρβοξυλωση του ακετυλοσουλωνίου Α στη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

Τρόπος εφαρμογής: Καθόλου ψεκασμός με τη χρήση μικρής τύπου σκώπας. Εφαρμόζετε χωρίς μετασυστηματικό / μεταφυτευτικό της καλλιέργειας και πριν οι γραμμές σποράς κλείσουν, όταν τα αγρωστώδη είναι σε ζωήρη ανάπτυξη και μέχρι το αδέφωτο του.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με την μιση ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευασμού υπό ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με την υπολοίπη ποσότητα νερού, αναμειγνύοντας την ανάδευση.

Καθαρσιώ ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τη χρήση, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα ίκνη του προϊόντος.

Συνδυαστικότητα: -

- **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:**
 - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση απόλυτης της καλλιέργειας, είναι δυνατή η φύτευση σπορά όλων των δικυτταροσών φυτών. Για τη φύτευση/ σπορά αγρωστωδών καλλιέργειών πρέπει να περάσουν 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του προϊόντος.
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Όταν εφαρμόζονται προγράμματα αμειωμοσράς, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.
 - της πρόσδεσης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκευασμό: Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φορούν κατάλληλο ρουχισμό εργασίας και γάντια εφόσον εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

Φυτοτοξικότητα: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ετικέτα. Χρονική σταθερότητα του σκευασμού: • Συνθήκες αποθήκευσης: Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του σκευασμένου στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από τρέφηση και ζωοτροφές, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

L1104234 SERAC 10 EC GREC/06B 1 LT

SERAC® 10 EC

syngenta.

GROUP 1 HERBICIDE

UFI: X5W0-6059-V00H-TTH4

Cycloxydim (χημική ομάδα κυκλοξείμων)

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70382/06.02.2020

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Cycloxydim 10% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 88,8% β/β

Περιέχει το διαλυτή "narpha".

Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτευτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο καταπολεμά ετήσια και πολυετή ζιζάνια.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

BSF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε.Ε., Παραδόσεις 2 & Κηφισίας, 151 25, Μαρούσι, Τηλ.: 2106860120, www.bsf-agro.gr

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε.Ε.,

Α. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49

Τηλ.: 210 666612-13 www.syngenta.gr,

6ΕΞ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™ are Trademarks of BASF SE. The ALLIANCE FRAME the SYNGENTA logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Τρόπος, χρόνος Εφαρμογής: Μπλή, Ακαθάριτο Κίτρινο: Κάνετε ανοιδικές – καλοκαιρινές εφαρμογές, μέχρι το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης του καρπού. (έως ΒΒCH 79). Αμλή (επιτραπέζιο, ανοιχόσπιο, σταφίδα): Κάνετε ανοιδικές – καλοκαιρινές εφαρμογές, μέχρι το πλήρες κλείσιμο των σταφυλίων. (έως ΒΒCH 79). Πατάτα: Κάνετε εφαρμογές κατά την ανάπτυξη του υπέργου τμήματος (ΒΒCH 10-19). Καρότο, Χρένο, Ραπανιά, Ξελινόριζα, Παστινά, Λαγόχοτρο: Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3^{ου} φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του ριζώματος. (ΒΒCH 13-45). Κρεμμύδι, Ξκόρο, Ακαθόλινο, Φρέσκο κρεμμυδάκι, Πρόσο: Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 5^{ου} φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του βλαστού. (ΒΒCH 15-45). Τομάτο, Πιπεριά, Μπιεζιζάνα: Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 2^{ου} φύλλου ως την ανάπτυξη του 3^{ου} πλευρικού βλαστού. (ΒΒCH 12-23). Λευκό Λάχανο, Λαχανάκια Βρυξελλών, Φυλλοειδές κράμβες (Κινέζικο λάχανο, Κόκκινο Λάχανο): Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3^{ου} φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του κεντρικού στελέχους. (ΒΒCH 13-35). Μαρρούλι, Σκαρόθα, Λυκιστριβόλο, Κόρσομο, Κόκκινο Λούινο, Γαιοκάρσομο, Σπανάκι, Αντράκιο, Αρωματικό φυτό: Κάνετε εφαρμογές από το 3^ο ως το 9^ο φύλλο. (ΒΒCH 13-19). Φασόλια (Φρέσκα με λαβή, Φασόλι Ξερό), Μπιεζιζάνα (Ξερό), Άντρον: Κάνετε εφαρμογές από το 3^ο ανέπτυτο φύλλο ως το στάδιο ανάπτυξης του 5^{ου} μεσογονατίου διαστήματος. (ΒΒCH 13-35). Ζαχαρότευθο, Κτηνοτροφικό τεύθο, Γογγύλι, Παντζάρι: Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3^{ου} ζεύγους φύλλων ως την πλήρη ανάπτυξη της ροζέτας. (ΒΒCH 16-39). Βαμβάκι: Κάνετε εφαρμογές από το 2^ο φύλλο ως το στάδιο έκπτυξης όλων των πλευρών βλαστού. (ΒΒCH 12-29). Επισκοκράμην: Κάνετε εφαρμογές από το 3^ο φύλλο ως το στάδιο ανάπτυξης του 5^{ου} μεσογονατίου διαστήματος. (ΒΒCH 13-35). Ίσγια: Κάνετε εφαρμογές από το 4^ο ως το 9^ο ανέπτυτο φύλλο. (ΒΒCH 14-19). Ηλιάνθος: Κάνετε εφαρμογές από το 2^ο ως το 8^ο φύλλο. (ΒΒCH 12-18).

Δόσεις σκευασμού για όλες τις καλλιέργειες:
Για Αγρωστώδη ζιζάνια (1): Όγκος κ.εκ. υγρού: 15-40 λίτρα/στρέμμα. Δόση 200 κ.εκ. σκ./στρέμμα για Μουκρίτσα (Echinochloa crus-galli), Αλεπουσάρα (Alopecurus myosuroides), Πολλάνη ήρα (Lolium multiflorum), Αιματόχοτρο (Digitaria sanguinalis), Βέλιουρας (Sorghum halepense), Στάρια (Setaria spp.), Βρόμος (Bromus spp.), Πάνικο (Panicum dichotomiflorum), Φάληρα (Phalaris spp.), Λεπτόχλοια (Lectochloa fascicularis), Φετούκια (Festuca spp.), Φυτό-εβελονές οπαρνού, κρηβαρού και βρώμης. Άγρια είδη κρηβαρού και βρώμης. Δόση 400 κ.εκ. σκ./στρέμμα για Αγριόδα (Cynodon dactylon). Δόση 500 κ.εκ. σκ./στρέμμα για Αγρόπυρο (Agropyron repens).

Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητικό περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:

- (1) • **Καταποδησόμενα ζιζάνια στη δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα:**
 - ευαίσθητα: Μουκρίτσα (Echinochloa crus-galli), Αιματόχοτρο (Digitaria sanguinalis), Βέλιουρας (Sorghum halepense), Στάρια (Setaria spp.), Βρόμος (Bromus spp.), Πάνικο (Panicum dichotomiflorum), Φάληρα (Phalaris spp.), Λεπτόχλοια (Lectochloa fascicularis), Φετούκια (Festuca spp.), Φυτό-εβελονές οπαρνού, κρηβαρού και βρώμης. Άγρια είδη κρηβαρού (Hordeum spp.) και βρώμης (Avena spp.), β) μητρού ευαίσθητα: Αλεπουσάρα (Alopecurus myosuroides), Πολλάνη ήρα (Lolium multiflorum).
- **Καταποδησόμενα ζιζάνια στη δόση των 400 κ.εκ./στρέμμα:**
 - α) μετρίως ευαίσθητα: Αγριόδα (Cynodon dactylon)
 - **Καταποδησόμενα ζιζάνια στη δόση των 500 κ.εκ./στρέμμα:**
 - α) μετρίως ευαίσθητα: Αγρόπυρο (Agropyron repens)

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Πατάτα, Φασόλι (Ξερό), Μπιεζιζάνα (Ξερό), Φασέκ, Λούινο, Ρεβίθια, Ίσγια: 56 ημέρες, Τομάτα, Μπιεζιζάνα, Λαχανάκια Βρυξελλών, Αμλή (επιτραπέζιο, ανοιχόσπιο, σταφίδα), Φυλλοειδές κράμβες (Κινέζικο λάχανο, Κόκκινο λάχανο), Φρέσκο κρεμμυδάκι, Πρόσο: 42 ημέρες, Καρότο, Ραπανιά: 35 ημέρες, Μπλή, Ακαθόλινο, Κιωνόδα, Φασόλια (Φρέσκα με λαβή), Κόρσομο, Ξκόρο, Ακαθόλινο, Σπανάκι, Λευκό Λάχανο, Αντράκιο, Αρωματικό φυτό: 28 ημέρες, Πιπεριά, Μαρρούλι, Σκαρόθα, Λυκιστριβόλο, Κόρσομο, Κόκκινο Λούινο, Γαιοκάρσομο: 21 ημέρες, Βαμβάκι, Άντρον, ορίζεται, Παντζάρι, Ξελινόριζα, Χρένο, Παστινά, Λαγόχοτρο, Επισκοκράμην, Ζαχαρότευθο, Κτηνοτροφικό τεύθο, Γογγύλι, Ηλιάνθος: Ορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, ...

Ειδικές συνθήκες συνθήκες, φυτοτοξικές ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευασμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Σε περίπτωση που οι γεωτονικές καλλιέργειες είναι αγρωστώδεις και έχουν φυτρώσει κατά τον χρόνο εφαρμογής του σκευασμού, πρόηστε για απόσταση ασφαλείας 1-5 μέτρων από αυτές. Στις προτεινόμενες χρήσεις και δόσεις, το σκευασμό δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στα μέρη του φυτού που αποτελούν πολλαπλασιαστικό υλικό. Στις ποσότητες καλλιέργειας που προορίζονται για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, το σκευασμό πρέπει να εφαρμόζεται πριν την αρχή της άνθησης. Διακείρηση ανθεκτικότητας: Για τη μείωση του κίνδυνου εμφάνισης ανθεκτικότητας, εφαρμόστε ή συνδυάστε το προϊόν με σκευασμό ή διαφορετικό τρόπο δράσης ή σκευασμό με διαφορετικές δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Είναι, κανένα προγράμματα αμειωμοσράς των καλλιεργειών. Το σκευασμό περιέχει την δραστική ουσία cycloxydim, ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα Α (παραμοιχάζει σύνθεση λιπιδίων) κατά ΗΡΑΕ.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξεπλύση (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προσηγομώς με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Το προϊόν κατατρέφεται με κώψιμο σε ειδικούς καυστήρες για αγροχημικά (περίπου 1100 °C για 2 δευτερόλεπτα).