

#### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθαρτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά τον χειρισμό. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Βυλάτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • Διάθεση περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

#### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210 7793777.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  
Περιέχει caraway seed oil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ – ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ για την καταπολέμηση του αλευρώδη σε τομάτα και αγγούρι. Συνιστάται επίσης για αφίδες, θρίπες, ακάρες, κοκκοειδή, βρωμικάδα, ψύλλοι, βρωμούσες και τζιτζικάρια, για τις καλλιέργειες που αναγράφονται στο φύλλο δράσης. Δρά δι' επαφής.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασιμό πλήρως καλυφώς του φυλλώματος. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να είναι «κρύφο». Αν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί βροχινό ή αποστασμένο νερό, δεν πρέπει να γίνεται εφαρμογή με μεγάλη υγρασία. Δεν πρέπει να ψεκάζονται φυτά που βρίσκονται σε κατάσταση stress.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι την μέση με νερό. Ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο την απαιτούμενη δόση. Συμπληρώνουμε στην συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση. Η ανάδευση του ψεκαστικού διαλύματος συνεχίζεται μέχρι τον τερματισμό του ψεκασμού.

#### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

**ΕΣΤΕΡΙΑΟΕΙΔΗ** (Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ) για Αλευρώδη, Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Ακάρες, ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά) για Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Ακάρες, ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλάδι) για Αφίδες, Κοκκοειδή, Θρίπες, Ψύλλοι, Ακάρες και ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερκοκιά, Ροδάκινια) για Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Βρωμικάδα, Ακάρες με δόσεις 1900 κ.εκ.οκ./στρέμμα ή 1900 κ.εκ.οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και 1000 κ.εκ.οκ./στρέμμα ή 1000 κ.εκ.οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. • Για την προστασία και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων. Μέχρι 4 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.

**Τομάτα (Y+Θ), Αγγούρι (Y+Θ), Πεπεριά (Y+Θ), Μελιτζάνα (Y+Θ), Φασόλι (Y+Θ), Μπιζέλι (Y+Θ), Κολλοκυνθοειδή (Y+Θ), Λάχανο (Y+Θ), Κουνουπίδι (Y+Θ) για Αλευρώδη, Αφίδες, Βρωμούσες, Θρίπες, Τούτα, Ακάρες, Αμπελή για Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας: Τζιτζικάρια, Θρίπες\*, Κοκκοειδή\*, Ακάρες\*, Βατόμουρα\* (Y), Φραγκοστάφυλα\* (Y) (κόκκινα, μαύρα ή σίπρα) (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας) για Ακάρες, Θρίπες, Ακνιδόφρα (Y) (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Adhis fabae, Adhis gossypii, Brachycaudus cardui, Myzus persicae, Tetradanych. Παντζάρι\* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Μπράκοδη\* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Αλευρώδη, Ακάρες, Σέλινο\* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Τετράνυχος, Θρίπες, Ξεκούσθα\* (ψύλλοι) (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Ραδίκι\* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Σκόροδο\* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Θρίπες, Φοκιά\* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Θρίπες, Ακάρες, Μαιντανός\* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Ακάρες, Ρόκα\* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Ακάρες, Κρεμμύδι φρέσκο\* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδη, Ξηανάκι\* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Γλυκοπατάτα\* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Ακάρες, Μπάμπια\* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδη, Ακάρες με δόσεις 750-1900 κ.εκ.οκ./στρέμμα ή 1500-1900 κ.εκ.οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων. Μέχρι 4 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.**

**ΚΑΛΑΜΠΙΤΙΚΑ, ΦΥΤΑ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΟΥ** για Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Ακάρες και Ελιά για Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας. Ακάρες\*, Κοκκοειδή\*, κηκιδόμυγα\*, Πυραλίδα\*, Καλόκηρο\*, Βρωμικάδα\* με δόσεις 1500-1900 κ.εκ.οκ./στρέμμα ή 1500-1900 κ.εκ.οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων. Μέχρι 4 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.

L1105190 CLAVITUS 13 SL GREC/07B 1lt Bottle Label (bottle label)



syngenta.

GROUP 28 INSECTICIDE

UFI: UX5F-S95K-5MOQ-08KD

Πυκνό διάλυμα (SL)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14783/24.11.2021

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**  
potassium salts of fatty acids (άλατα καλίου λιπαρών οξέων): 13,04 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 83,27 % β/β

**ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ – ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ**

για την καταπολέμηση του αλευρώδη σε τομάτα, αγγούρι και άλλων εχθρών σε διάφορες καλλιέργειες.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.


ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 28ο χλμ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΑΦΙΛΑΝΣΕ Τ.Κ. 190 14, ΤΗΛ: 22950 45100

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπροσώπων ΑΕΒΕ Α. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49 Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr 0ΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

1 l e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Πόλυ τοξικό για τους υδαρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

«Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2017/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν»

**Μπανάνα (Y+Θ)\* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)** για Ακάρες με δόσεις 1500 κ.εκ.οκ./στρέμμα και με όγκο ψεκ. υγρού 100-200 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων. Μέχρι 4 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

• Στις καλλιέργειες υπαίθρου, να μην εφαρμόζεται κατά την περίοδο της ανθοφορίας, όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας και σε περίπτωση που εμφανίζεται μελιτώμα.

\*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητας και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδοχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος. Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη εφαρμογή του σκευάσματος»

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης: 0 ημέρες (μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής).

#### Αυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης. Στην αχλαδιά να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη δόση και να προηγείται δοκιμή στις ευαίσθητες ποικιλίες.

#### Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο μετά τον ψεκασμό. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή και τα εξαρτήματα της τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να απομακρυνθούν.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

• Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στην συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική potassium salts of fatty acids, με άγνωστο μηχανισμό δράσης (ομάδα unknown) κατά IRAC. Συνιστάται η επανάληψη με εντομοκτόνο που δεν ανήκει σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Να μην εισέρχονται άνθρωποι ή ζώα στη ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό. Αν εισέλθει εργαζόμενος στη ψεκασμένη περιοχή μετά τον ψεκασμό και πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να φορά γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρομάνικο πουκάμισο.

Συνδυαστικότητα: ---

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται σε Ξηρό, δροσερό, κλειστό και καλά αεριζόμενο χώρο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. Να προστατεύεται από συνθήκες παγετού.

