



Klerat[®] Soft XT

syngenta[®]

UFI: CREW-V0D9-X005-9M9P

Δόλωμα (έτοιμο για χρήση) (RB)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Brodifacoum 0,0025 % β/β
Λοιπές βοηθητικές ουσίες: μέχρι 100 %

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά:
ΤΠ14-0210-0Π-2/ 24-10-2022

ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ (ΒΙΟΚΤΟΝΟ) δόλωμα (RB)
που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση
των οικιακών ποντικών, των καφέ αρουραίων
και των αρουραίων οροφής σε εσωτερικούς
και σε εξωτερικούς χώρους (περιμετρικά των κτιρίων).

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

«Μόνο για επαγγελματίες χρήστες»

«Χρήση μόνο σε σφραγισμένους δολωματικούς σταθμούς»

«Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία
απεντόμωσης- μυοκτονίας»

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Rentokill Initial Limited, Hazel House,
Millenium Park, Naas, Co Kildare, Ιρλανδία

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49

Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Συμβουλευτείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- Διάθεση του περιεχομένου σε αδειοδοτημένο συνεργείο διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων ή χώρο συλλογής, εκτός από άδεια καθαρά δοχεία που μπορούν να απορριφθούν ως μη επικίνδυνα απόβλητα.
- Περιέχει 1,2-βενζοϊσοθειαζολιν-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Διάρκεια ζωής προϊόντος: 2 χρόνια
Αριθμ. παρτίδας/ Ημερ. παραγωγής:
Βλέπε σφαγίδα.

300 gr e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

Αναητικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος: Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 που χορηγείται μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό. Σε περίπτωση **δερματικής έκθεσης**, πλύνετε το δέρμα με νερό και κατόπιν με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση **οφθαλμικής έκθεσης**, ξεπλύνετε τα μάτια με διάλυμα πλύσης ματιών ή νερό και κρατήστε τα βιόφαρα ανοιχτά τουλάχιστον για 10 λεπτά. Σε περίπτωση **στοματικής έκθεσης**, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Μην δίνετε ποτέ οτιδήποτε από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση **κατάποσης**, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο. Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν σήμανση με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην μετακινηθεί και να μην ανοιχτεί», «περιέχει τρωκτικοκτόνο», «όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης», «δραστικές ουσίες» και «σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων».

Επικίνδυνο για την άγρια ζωή.

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777

Μέτρα μετριασμού κινδύνων: Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή, ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής εφαρμογής και των γειτονικών περιοχών) σχετικά με την καταπολέμηση των τρωκτικών. ● Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων ελέγχου (π.χ. καλύψτε τυχόν οπές, απομακρύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο πιθανά τρόφιμα και ποτά) για μεγαλύτερη κατανοήσιμη του προϊόντος και μείωση της πιθανότητας επανεισοβολής. ● Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, πρέπει να αναζητάτε και να απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστων πρακτικών. ● Μην χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τρωκτικών. ● Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εφαρμογές με διαλείπουσα δόλωση. ● Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν απευθείας στις φωλιές. ● Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχουν υποψίες για αντίσταση στη δραστική ουσία. ● Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πέραν των 35 ημερών χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής. ● Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με συγκρίσιμη ή ασθενέστερη ισχύ για σκοπούς διαχείρισης της ανθεκτικότητας. Για εναλλασσόμενη χρήση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, εάν διατίθεται, ή πιο δραστικού αντιπηκτικού. ● Μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης μεταξύ των εφαρμογών. ● Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. ● Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, πρέπει να αναζητάτε και να απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα). ● Οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν ουσιαστικά τους δολωματικούς σταθμούς με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα 5.3 της ΠΧΠ (π.χ. «επισήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος»). ● Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαιρείται τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. ● Σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας έως το τέλος της εφαρμογής (δηλαδή εξακολουθεί να παρατηρείται δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλευτεί τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει υπηρεσία καταπολέμησης παρασίτων. ● Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς με νερό μεταξύ των εφαρμογών. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση: Κατά την τοποθέτηση δολωμάτων κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή του δολώματος με το νερό.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:

Κατηγορία χρηστών: Επαγγελματίες χρήστες

Μέθοδος εφαρμογής: Δολωματική εφαρμογή. Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας ή σε άλλα καλυπτόμενα σημεία δόλωσης.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής: ● Καφέ αρουραίος (*Rattus norvegicus*) και Αρουραίος οροφής (*Rattus rattus*) – Νεαρά και Ενήλικα άτομα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς (περιμετρικά των κτιρίων) χώρους: Μέχρι 200γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 10 μέτρα που μειώνονται στα 5 μέτρα σε περιοχές υψηλής προσβολής. ● Οικιακό Ποντίκι – Νεαρά έως Ενήλικα (*Mus musculus*) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς (περιμετρικά των κτιρίων) χώρους: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό, κάθε 10 μέτρα που μειώνονται στα 5 μέτρα σε περιοχές υψηλής προσβολής.

Οδηγίες Χρήσης: • Απομακρύνετε το προϊόν που έχει απομείνει στο τέλος της περιόδου εφαρμογής. • Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε περιοχές που δεν είναι δυνατόν να πλημμυρισούν. • Αντικαταστήστε το δόλωμα στους δολωματικούς σταθμούς που έχει υποστεί ζημιά από νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες. • Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής. • Κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε μη στοχευόμενα είδη.

Γενικές οδηγίες χρήσης: • Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες του προϊόντος, καθώς και τυχόν άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε. • Διενεργήστε προκαταρκτική έρευνα για την προσβεβλημένη περιοχή και επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να εντοπίσετε το είδος των τρωκτικών και τους τύπους δραστηριότητάς τους, καθώς και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής. • Απομακρύνετε τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα στα τρωκτικά (π.χ. πεσμένοι σπόροι ή υπολείμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε την προσβεβλημένη περιοχή αμέσως πριν από την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και καθιστά δυσκολότερη την επίτευξη της κατανάλωσης του δολώματος. • Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικών μεθόδων ελέγχου. • Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται σε άμεση γειτνίαση με περιοχές όπου έχει προηγουμένως διερευνηθεί η δραστηριότητα των τρωκτικών (π.χ. διαδρομές, φωλιές, σημεία τροφής, οπές, λιγαύμια κ.λπ.). • Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές. • Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη σήμανση που να δείχνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινηθούν ή να ανοιχτούν. • Το δόλωμα πρέπει να ασφαρίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να συρθεί μακριά από τον δολωματικό σταθμό. • Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και εκτρεφόμενα ζώα και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο. • Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από οκέυ ή επιφανείες που έρχονται σε επαφή με αυτά. • Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στις χημικά ουσίες κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού του προϊόντος (EN374). • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλένετε τα χέρια σας και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος. • Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή στην οποία έχει γίνει η εφαρμογή θα πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη, υπό το πρίσμα της έρευνας που διενεργήθηκε κατά την έναρξη της εφαρμογής. • Η συχνότητα αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστων πρακτικών. • Εάν η κατανάλωση του δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο αντικατάστασης των σημείων δολώματος σε περαιτέρω σημεία και την πιθανότητα αλλαγής σε άλλη μορφή δολώματος. • Εάν, μετά από περίοδο εφαρμογής 35 ημερών, τα δολώματα εξακολουθούν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να προσδιορίσετε ή πιθανή αιτία. Εάν έχουν αποκλειστεί όλα τα άλλα στοιχεία, είναι πιθανό ότι υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, επομένως, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου είναι διαθέσιμο, ή πιο δραστικού αντιπηκτικού. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο της χρήσης παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου. • Για δόλωμα πάστας: Χρησιμοποιήστε σπάτουλα για τον (καθαρισμό/απόρριψη) του δολώματος μετά την εφαρμογή. • Εξετάστε το ενδεχόμενο ήπιων προληπτικών μέτρων ελέγχου (καλύψτε τυχόν οπές, απομακρύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο πιθανά τρόφιμα και ποτά) για μεγαλύτερη κατανάλωση του προϊόντος και μείωση της πιθανότητας επανεπιβολής. • Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει εφαρμοστεί η εφαρμογή θα πρέπει να σημαίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής και θα πρέπει να υπάρχει μαζί με τα δολώματα και μια πινακίδα που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, καθώς και να αναφέρει τα πρώτα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης. • Το δόλωμα πρέπει να ασφαρίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να συρθεί μακριά από τον δολωματικό σταθμό. • Το δόλωμα που έχει απομείνει ή οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να απομακρύνονται στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του:

• Στο τέλος της εφαρμογής, απορριψτε τα δολώματα που δεν έχουν καταναλωθεί και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. • Συνιστάται η χρήση γαντιών.

Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης:

• Να φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. • Να φυλάσσεται σε χώρους στους οποίους δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων και εκτρεφόμενων ζώων. • Χρόνος ζωής: 24 μήνες.

Άλλες πληροφορίες:

Καθώς όνουν με καθυστέρηση, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα χρειάζονται από 4 έως 10 ημέρες για να έχουν αποτέλεσμα μετά την κατανάλωση του δολώματος. Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια· χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες κατά την απόρριψή τους. Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα και χρωστική ουσία.

