

L1101910 GREC/04B PPE4180642



# Vertimec<sup>®</sup> Pro

1,8 SC

syngenta<sup>®</sup>

**GROUP 6 INSECTICIDE**

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Abamectin (χημική ομάδα αβερμεκτινών)

**Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):  
14446/07-06-2013

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**

Abamectin 1,8 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες 98,25 β/β  
(περιέχει διαλύτη  
1,2-βενζισοθειαζοή-3  
(2H)-όνη)

**Εντομοκτόνο –  
ακαρεοκτόνο  
στομάχου και  
επαφής.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ  
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**Προορίζεται μόνο για  
επαγγελματίες χρήστες**

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:**

**Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.**

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής,  
153 49, Τηλ.: 210 6666612-13 - [www.syngenta.gr](http://www.syngenta.gr)  
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked © or ™, the ALLIANCE FRAME  
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON  
are Trademarks of a Syngenta Group Company

**5 l e**



- **Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης και σε περίπτωση εισπνοής.**
- **Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.**
- **Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**

## **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

• Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μην αναπνέετε σταγονίδια. • Πλύνετε το δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • «Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και την εφαρμογή». • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

## **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

**Γενικά:** Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

**Αντιδοτο:** Δεν υπάρχει γνωστό αντιδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Να αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροϊκού οξέος. Σε περίπτωση κατάποσης, να χορηγηθούν 2-3 ποτήρια νερό και να προκληθεί εμετός, μόνο εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, με ερεθισμό του φάρυγγα.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

**Μην μοιύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**  
Να μην πλένεται τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

### **Τοξικό για τις μέλισσες.**

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**Τρόπος δράσης:** Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από αστία.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. Έγχυση στον κορμό.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα πριν τη χρήση.

Προσθέστε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος και όπου συνιστάται ραδιού ανακατεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Για τη διαχείριση κινδύνων ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να εφαρμόζεται το σκεύασμα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του και σε εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης. Να μην πραγματοποιούνται δύο συνεχόμενες εφαρμογές με το ίδιο προϊόν, αλλά να εναλλάσσεται με εντομοκτόνα ή ακαρεοκτόνα που δρουν με διαφορετικό τρόπο.  
**Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδωδόμε καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο – Φεβρουάριο).**

**Συνδυαστικότητα:** ----.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Να μην εισέρχεται στις ψεκασμένες περιοχές χωρίς μέσα ατομικής προστασίας για τουλάχιστον 2 ώρες μετά τον ψεκασμό.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

**Χρονικά σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:** Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**

**Κοιλοκύβες (Θ), Πεπόνια (Θ), Καρπούζια (Θ), Φράουλες (Θ):** 3 ημέρες.

**Φάσμα δράσης:**

**Πεπόνι (Θ), καρπούζι (Θ), κοιλοκύθα (Θ):**

• Για Τετράνυχο, *Aculus lycopersici* με δόση 30-120 κ.εκ.σκ./στρέμμα ή 60 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-200 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Μέχρι 3 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.

• Για Θρίπα με δόση 75-120 κ.εκ.σκ./στρέμμα ή 75 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-160 λίτρα/στρέμμα. Στα πρώτα προνυμφικά στάδια. Μέχρι 3 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.

• Για Λυριόμυζα με δόση 30-120 κ.εκ.σκ./στρέμμα ή 60 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-200 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων στοών. Μέχρι 2 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.

**Φράουλα (Θ):**

• Για Τετράνυχο με δόση 50 κ.εκ.σκ./στρέμμα ή 40 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-125 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Μέχρι 2 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.

• Για Θρίπα με δόση 75-80 κ.εκ.σκ./στρέμμα ή 75 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-160 λίτρα/στρέμμα. Στα πρώτα προνυμφικά στάδια. Μέχρι 2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

**Φυλλοσπόρα – Κωνοφόρα για φύτευση σε δρόμους και πάρκα:**

• Για *Cameraria ohridella*, *Thaumetoroea pityocampa* με δόση 10-40 κ.εκ.σκ. σκευάσματος ανά λίτρο νερό. Εφαρμόστε το προϊόν με έγχυση στον κορμό μετά την ανθοφορία, στα πρώτα προνυμφικά στάδια.\*

• Για *Corythucha ciliata*, *Aphis spp.*, *Acali spp*, *Tetranychus spp*, *Eriofidi spp* με δόση 10-40 κ.εκ.σκ. σκευάσματος ανά λίτρο νερό. Εφαρμόστε το προϊόν με έγχυση στον κορμό, κατά τη νέα βλάστηση των φυτών.\*

**Παρατηρήσεις:**

\* Η έγχυση στον κορμό πρέπει να πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό από εξειδικευμένο χρήστη.

Για την εφαρμογή του προϊόντος με έγχυση στον κορμό, ο χρήστης πρέπει να φορά ατομικά μέσα προστασίας για την προφύλαξη της αναπνευστικής οδού, του δέρματος, των οφθαλμών/προσώπου, τόσο κατά την εφαρμογή όσο και κατά την προετοιμασία του μίγματος και την διαχείριση του στο τέλος της εφαρμογής. Κατά την εφαρμογή ή πριν την εφαρμογή του σκευάσματος μέσω έγχυσης στον κορμό, να τοποθετούνται δεοδεία, τοποθετημένα κάτω από τα δένδρα, με σκοπό την αποφυγή πιθανών διαρροών. Η περιοχή που έχει εφαρμοστεί το προϊόν μέσω έγχυσης, θα πρέπει να περιφραχθεί για να αποτραπεί η είσοδος και η πρόσβαση.

• Χρησιμοποιείστε κατάλληλο εξοπλισμό για να εξασφαλίσετε επαρκή διαβροχή και καλή κάλυψη της καλλιέργειας.

• Ανεξαρτήτως από τους όγκους νερού, συνιστάται να τηρείτε τις δόσεις ανά στρέμμα που αναφέρονται παραπάνω.

