

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Καταπολεμά έντομα εδάφους. Παρεμποδίζει την λειτουργία των διαύλων ιόντων νατρίου προκαλώντας παρατεταμένο άνοιγμα αυτών που οδηγεί σε υπερευαισθησία του νευρικού συστήματος, διακοπή της διατροφής, παράλυση και τελικά το θάνατο των εντόμων. Δρα δι’ επαφής μέσω απορρόφησης του από την επιδερμίδα, αλλά έχει κάποια δράση δια στομάχου. Δεν είναι διασυστηματικό, αλλά έχει δράση με ατμούς. Έχει γρήγορη αρχική δράση και αρκετή υπολειμματική διάρκεια. Επιπλέον, λόγω των ατμών που δημιουργούνται στην εδαφική ζώνη, τα έντομα απομακρύνονται και δεν πλησιάζουν τα φυτά στη γραμμή εφαρμογής.

Τρόπος εφαρμογής: Το σκεύασμα εφαρμόζεται κατά μήκος της γραμμής φύτευσης κατά την σπορά ή μεταφύτευση με κοκκοδιανομείς κατάλληλα καλιμπραρισμένους.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Ζαχαρότευτλα: Για Άητης (*Chaetocnema tibialis*), Ατομάρια (*Atomaria linearis*), Σύμφυλα (*Scutigerella immaculata*), Τιπουλίδα (*Tripula sp.*), Σιδηροσκούληκα (*Agriotes sp.*): 1,2-1,5 κιλά σκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή με διασπορά και ενσωμάτωση στη γραμμή σποράς κατά τη σπορά.

Στάρι, Κριθάρι: α) Για Σύμφυλα (*Scutigerella immaculata*), Υλέμια (*Hylemya sp.*), Τιπουλίδα (*Tripula sp.*), Βίβιο (*Bibio hortulanus*): 1,2 κιλά σκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή με διασπορά και ενσωμάτωση στη γραμμή σποράς κατά τη σπορά. **β)** Για Μπλοθόνθη (*Melolontha melolontha*), Σιδηροσκούληκα (*Agriotes sp.*): 1,6 κιλά σκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή με διασπορά και ενσωμάτωση στη γραμμή σποράς κατά τη σπορά.

Αραβόσιτος, Γλυκό καλαμπόκι, Σόργο: Για Σιδηροσκούληκα (*Agriotes sp.*), Υλέμια (*Hylemya sp.*), Σύμφυλα (*Scutigerella immaculate*), Τιπουλίδα (*Tripula sp.*), Αγρότιδα ή καραφατμέ (*Agrotis sp.*), Διαβρώτικα (*Diabrotica sp.*): 1,6 κιλά σκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή με διασπορά και ενσωμάτωση στη γραμμή σποράς κατά τη σπορά.

Ελαιοκράμβη, Ηλιάνθος, Σόγια: Για Άητης (*Chaetocnema tibialis*), Σιδηροσκούληκα (*Agriotes sp.*), Υλέμια (*Hylemia sp.*), Αγρότιδα ή καραφατμέ (*Agrotis sp.*): 1,2-1,6 κιλά σκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή με διασπορά και ενσωμάτωση στη γραμμή σποράς κατά τη σπορά.

Λαχανικά (Υ): Καρότο, Σέλινο, Γογγύλι, Λάχανο, Κουνουπίδι, Πεπόνι, Καρπούζι, Μάραθος, Σπαράγγι, Φασόλι, Φασολάκι φρέσκο, Μπιζέλι, Αγγούρι, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Λυκοτριβόθο, Κάρδαμο και άλλα βλασάκια και φυτρες, Γαιοκάρδαμο, Ρόκα, Κόκκινο σινάπι, Καλλιέργειες νεαρών φύλλων, συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης (δηλαδή που συγκομίζονται μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου): Για Άητης (*Chaetocnema tibialis*), Σιδηροσκούληκα (*Agriotes sp.*), Αγρότιδα ή καραφατμέ (*Agrotis sp.*), Καροτόμυγα (*Ceutorhynchus pleurostigma*, *Chamaeepsila rosae*), Σαρανταποδαρούσα (*Blattulul guttulatus*), Υλέμια (*Hylemya sp.*), Μελοθόνθη (*Melolontha melolontha*), Τιπουλίδα (*Tripula sp.*): 1,6 κιλά σκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή με διασπορά και ενσωμάτωση στη γραμμή σποράς ή φύτευσης κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση.

Πατάτα: Για Σιδηροσκούληκα (*Agriotes sp.*), Αγρότιδα ή καραφατμέ (*Agrotis sp.*), Διαβρώτικα (*Diabrotica sp.*): 1,2-1,6 κιλά σκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή με διασπορά και ενσωμάτωση στη γραμμή σποράς ή φύτευσης κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση ή κατά τη δημιουργία αναχωμάτων (BBCH 105-125).

Καπνός: Για Σιδηροσκούληκα (*Agriotes sp.*), Αγρότιδα ή καραφατμέ (*Agrotis sp.*), Τιπουλίδα (*Tripula sp.*): 1,6 κιλά σκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή με διασπορά και ενσωμάτωση στη γραμμή σποράς ή φύτευσης κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση.

Βαμβάκι: Για Σιδηροσκούληκα (*Agriotes sputator*, *Agriotes lineatus*, *Agriotes obscurus*, *Agriotes rufipalpis*, *Agriotes litigiosus*, *Athous sp.*, *Agriotes sericeus*, *Agriotes sordidus*, *Agriotes sparsus*, *Aeolus sp.*, *Conoderus sp.*, *Umonius sp.*, *Hemicrepidius sp.*, *Melanotus sp.*, *Drasterius sp.*, *Agrionichis sp.*, *Lacon sp.*): 1-1,5 κιλά σκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή με διασπορά και ενσωμάτωση στη γραμμή σποράς κατά τη σπορά.

Παρατηρήσεις:

1) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το αναμενόμενο επίπεδο προσβολής και του ιστορικού της περιοχής. Να χρησιμοποιείτε τις μεγαλύτερες δόσεις στα αγροτεμάχια όπου την περασμένη καλλιεργητική περίοδο παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες προσβολές.

2) Όταν αναμένονται προσβολές εντόμων που διαρκούν για πολύ χρόνο και ιδιαίτερα στις καλλιέργειες ντομάτας και μελιτζάνας μπορεί να είναι αναγκαίο να γίνουν επεμβάσεις σε δύο διαδοχικές χρονικές στιγμές: μια πρώτη επέμβαση κατά τη σπορά/ μεταφύτευση και μια δεύτερη κατά την άρωση/ κάλυψη του σπόρου.

3) Οι βοηθητικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος περιέχουν άζωτο και φώσφορο (10:44), μαγγάνιο (3%) και ψευδάργυρο (2%), η περιεκτικότητα των οποίων λαμβάνεται υπόψη στην λίπανση του εδάφους προκειμένου να αποφευχθεί υπερδόσολογία λιπασμάτων.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: -

Καθαρισμός κοκκοδιανομέα: Αμέσως μετά την εφαρμογή, ο εξοπλισμός πρέπει να ξεπλένεται με άφθονο νερό.

Συνδυαστικότητα: -

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Για όλες τις καλλιέργειες: -

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλιστεί: Για την αποφυγή ανθεκτικότητας συνιστάται η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, η εναλλαγή καλλιεργειών και η εφαρμογή ορθής γεωργικής πρακτικής. Το σκεύασμα περιέχει tefluthrin, ένα εντομοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 3Α κατά IRAC.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

L1086278 GREC/02A FORCE_EVO_BAG_10kg


Force[®] EVO


syngenta

GROUP 3A INSECTICIDE

Tefluthrin (χημική ομάδα

πυρεθρινοειδών)

Κοκκώδες (GR)

Εγγυημένη σύνθεση:

Tefluthrin 0.5 % β/β (= 5 g/Kg)

Βοηθητικές ουσίες: 95 % β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης

στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

14736/06.02.2020

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο που καταπολεμά έντομα εδάφους.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: DIACHEM DIACHEM S.p.A. Via Tonale 15, 24061 Albano S. Alessandro (BG), Ιταλία, Τηλ.: +39 0363.355611

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ,

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49

Τηλ.: 210 6666612-13 - www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

10 kg e

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
•Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
•Αποφύγετε να αναπνεύτε τη σκόνη.
•Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
•Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

•Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ζωοτροφές και ποτά.
•Διάθεση περιχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
•Κατά την φόρτωση και την ανάμειξη να φοράτε προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλη προστατευτική μάσκα (τύπου FFP2).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια, κρατώντας τα βρέφαρα χωριστά και αφού απομακρύνετε πριν τους φακούς επαφής, με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και κορηγείτε μεγάλες ποσότητες νερού. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Μην κορηγώσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ: 210 7793777

<p>Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).</p> <p>Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες των λαχανικών ρίζας και στελέχους, της σόγιας, του καπνού, καρποφόρων, βοτβωδών λαχανικών, ψυχανθών και 20 μέτρων για τις καλλιέργειες των φυλλωδών λαχανικών.</p>
--

<p>Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>
--

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική κλειστή συσκευασία του και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Να αποθηκεύεται σε μέρος δροσερό και στεγνό μακριά από υγρασία.

<p>ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Tefluthrin)</p>	<p>KEEP AWAY FROM FOOD AND FEEDING STUFFS</p>
<p>UN3077</p>	<p>9</p>
<p>For specialist advice Haddenstraße 44 1488 133844</p>	<p>Artwork No. L121855 PPE 28658</p>

