



syngenta®

**Γαλακτώδες αιώρημα (Suspoemulsion, SE)**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70357/04.11.2019

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Florasulam: 0,63 % β/ο**

**2,4-D 2- ΕΗΕ: 45,25 % β/ο**

**(που ισοδυναμεί σε 30 % β/ο 2,4-D ισοδύναμο οξύ)**

**Βοηθητικές ουσίες: 54,39 % (β/β)**

**Εκλεκτικό διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτηρά.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:**

**ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**

Λ. Κηφισίας 44, Κτίριο Γ, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 211 120 5570

**ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.,**

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49, Τηλ.: 210 6666612-13

www.syngenta.gr - ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

GROUP **24** HERBICIDES



- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**800 ml e**

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company


**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση». • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Βγάψτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

**Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.**  
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή να αφύστετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από μη γεωργική γη όταν ο ψεκασμός γίνεται με συμβατικά ακροφύσια.

**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Εκλεκτικό δισυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτηρά. Μίγμα δύο δραστικών ουσιών του Florasulam που δρα αναστέλλοντας τη δράση του ενζύμου οξεικογλυκαλική συνθάση, απαραίτητο για την βιοσύνθεση αμινοξέων και το 2,4-D που δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και των ριζών και τελικά τη νέκρωση των ζιζανίων.

**Τρόπος εφαρμογής:** Μεταφυτρωτικός ψεκασμός με 20-40 λίτρα νερό / στρ. με ακροφύσια τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm. (30 - 45 psi) υπό συνεχή ανάδευση.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τα 2/3 με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδίδοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Εφαρμόζετε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού, υπό συνεχή ανάδευση.

**800 ml e**

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**

**Στάρι (μαλακό και σκληρό), Κριθάρι:** Για Πλατύφυλλα ζιζάνια\*. Δόση: 75 κ.εκ.σκ./στρ με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρ. Μία (1) μεταφυτρωτική εφαρμογή από την έναρξη του αδεσφάμματος μέχρι το δεύτερο κόμβο (BBCH 21-32) και μέχρι το στάδιο των 4-6 φύλλων των ζιζανίων.

**Παρατηρήσεις:**

1. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες.

2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν είναι τα ζιζάνια σε κατάσταση στρες.

3. Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή. \*Καταπορευόμενα ζιζάνια.

**Ευαίσθητα ζιζάνια:** Ανθεμίδα (Anthemis sp), Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), Αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum), Αναρριχώμενο πολύγωνο (Fallopia convolvulus), Μεγαλόκαρη κολλιτσίδα (Galium aparine), Υνίκοο (Hypercium imberbe), Χαμομήλι (Matricaria chamomilla), Κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas), Αγριο σινάπι (Sinapis arvensis), Ετήσιος ζωχός (Sonchus oleraceus), Στελλάρια (Stellaria media). **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** Κίριοιο (Cirsium arvense)

**Τελειοείδη επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Σιτηρά: Δεν ορίζεται, λόγω του χρόνου εφαρμογής του προϊόντος.

**Διαχείριση ανεπιθύτητας:** Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές Florasulam και 2,4-D, οι οποίες κατά HRAC ανήκουν στις ομάδες B και O αντίστοιχα. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανεπιθύτητας.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:**

• **σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Στα συνήθη προγράμματα αμειψοπορίας δεν υπάρχει περιορισμός για τις επόμενες καλλιέργειες. Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μετά τον ψεκασμό, μπορείτε να σπείρετε σιτάρι, κριθάρι, σικάλη, τριτσάλη, βρώμη και καλαμπόκι χωρίς κανένα διάστημα αναμονής.

• **της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Ωστόσο, για αποτελεσματικότερο καθαρισμό, συνιστάται η εφαρμογή της ακόλουθης διαδικασίας:

1. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό.

2. Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ. Προσθέστε απορρυπαντικό με βάση οικιακής αμμωνίας ή οικιακής χλωρίνης σε συγκέντρωση 0,5%. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με το διάλυμα απορρυπαντικού και αφήστε το για 10 λεπτά.

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο.

3. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό.

**Συνδυαστικότητα: -**

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Στην αρχική του παραβίαση συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

