

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

• Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

• Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φερομονών πριν και μετά την εφαρμογή, χωρίς να πλύνετε καλά τα χέρια σας πρώτα.

• Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μάσκα κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.

• Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας.

• Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 7793777

L1095496 EXPLOYO VIT GREC/11A 1 lt booklet

**Explovo™ Vit**

syngenta

Συμπυκνωμένο αιώρημα μικροκαψουλών (CS)**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**(IE, Z)-7, 9-dodecadien-1-yl acetate 2,4 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 97,3 % β/βΑριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
9/103/10.08.2022**Φερομόνη για παρεμπόδιση της σύζευξης του εντόμου Ευδεμίδας (Lobesia botrana) στο αμπέλι.****ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ****Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:** M2i Biocontrol S.A.S.

1 rue Royale 112, Bureaux de la Colline, 92213,

Saint Cloud Cedex, Γαλλία, Τηλ. +33 5 59 71 78 77

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

Syngenta Hellas Μονοπροσωπική Α.Ε.Ε.,

Α. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49,

Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σινδός, Τηλ.: 231 0796940-3

Επιβαρβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**1 lt e**

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME™, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON™ are trademarks of a Syngenta Group Company

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.****Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).****Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.****«Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν»**

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Φερομόνη για παρεμπόδιση της σύζευξης του εντόμου Ευδεμίδας (*Lobesia botrana*) στο αμπέλι. Η φερομόνη προσελκύει τα αρσενικά ακμαία άτομα του εντόμου στόχου παρεμποδίζοντας έτσι τη σύζευξη. Το προϊόν επιδρά μόνο στα αρσενικά ακμαία άτομα και δεν έχει καμία επίδραση στα θηλυκά ακμαία, στα αυγά ή τις προνύμφες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Ο ψεκασμός θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την Παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται περισταλτικές ή με ταχύτητες αντλίες καθότι οι μικροκάψουλες μπορεί να καταστραφούν. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση 5 bars.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
Αλλιάζετε γάντια όταν έχετε πιάσει προηγούμενως άλλης φερομόνες.

• Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη καλού αποτελέσματος είναι να υπάρχουν χαμηλοί πληθυσμοί εντόμων. Στις περιπτώσεις μεσαίων και μεγάλων πληθυσμών είναι απαραίτητο τα πρώτα χρόνια να γίνει εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου ειδικά για την καταπολέμηση της πρώτης γενεάς για να μειωθεί η πίεση των εντόμων.

• Γονιμοποιημένα θηλυκά που προέρχονται από γειτονικούς αγρούς μπορεί να προκαλούν ζημιές γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι στους καρπούς για να αποφασιστεί εάν χρειαστεί και επέμβαση με εντομοκτόνο.

• Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε μεγάλα αγροτεμάχια ή όταν χρησιμοποιείται το σκεύασμα σε μεγάλη έκταση. Μπορούν να προστατευθούν ακόμα και μικροί αμπελώνες, όταν βρίσκονται απομονωμένοι και υπάρχει χαμηλός πληθυσμός εντόμων αλλιώς τότε είναι απαραίτητη αύξηση του αριθμού των σημείων ψεκασμού, για να διατηρηθεί μια επαρκώς υψηλή συγκέντρωση των φερομονών στον αέρα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιεργειών.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Φάσμα δράσης:

Αμπέλι (οινοποιήσιμες ποικιλίες): για *Ευδεμίδα (Lobesia botrana)* με δόση 100 κ.εκ.σκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-30 λίτρα/στρέμμα. Οι ψεκασμοί γίνονται από την έναρξη της πτήσης της δεύτερης γενιάς^{1,2} (BVCH 55-89). Μέγιστος αριθμός 4 εφαρμογών ανά έτος με 7 ημέρες μεσοδιάστημα εφαρμογών.

Παρατηρήσεις:

- 1) Να πραγματοποιούνται ψεκασμοί με εντομοκτόνα φ.π. στην πρώτη γενιά του εντόμου. Στις επόμενες γενεές, η εφαρμογή εντομοκτόνων φ.π. είναι προαιρετική και εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
- 2) Τοποθετήστε στο αγροτεμάχιο φερομονικές παγίδες παρακολούθησης παρακολούθησης (monitoring) και ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις.
- 3) Σε αγρούς με ιστορικό υψηλής πίεσης πληθυσμού ή σε περίπτωση εμφάνισης μη αποδεκτών προσβολών πραγματοποιείστε συμπληρωματικά εφαρμογές με κατάλληλα εντομοκτόνα ή άλλης μεθόδους καταπολέμησης.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Διατηρείται στην αρχική αλληλοδιαστητή συσκευασία του, σε δροσερό και ξηρό μέρος σε θερμοκρασία 0°C έως 30°C. Φυλάξτε το μακριά από τη θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Αμπέλι (οινοποιήσιμες ποικιλίες):
21 ημέρες

