

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φοράτε οδώσιμο προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτιση. • Φοράτε γάντια, οδώσιμο προστατευτική ενδυμασία, ατομικά μέσα προστασίας της αναπνοής, προσώπιδα, κουκούλα και μπότλες κατά την εφαρμογή. • Η εφαρμογή να γίνεται μόνο με ειδικού τύπου με κλειστή καμπίνα. • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε οδώσιμο φόρμα εργασίας και γάντια. • Για να προστατέψετε τους παρευρισκόμενους να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γη. • Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:** Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ: 210 7793777**

### Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

(Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιπόδρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων για τα Μηλίαιδα, 10 μέτρων για πατάτα και μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για το αμπέλι από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Παρεμποδίζει την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα των παθογόνων με δράση στη λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείτε καλά πριν από την χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αργά και υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας.



L1117188 SAGITERRE 500 SC GREC/03C 1lt



# Sagiterre™ 500SC

syngenta®

GROUP 29 FUNGICIDE

UFI: 5S96-JNMN-DQ0W-U68C

Fluazinam (χημική ομάδα: Πυριδιναμίνη)

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 61131/18.10.2023

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

fluazinam 50 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 59,3 % β/β

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, Μαρούσι 151 25  
Τηλ.: 211 1205570

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ  
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49  
Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr  
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lte

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Υποπίεση προκλήσει βλάβες στο έμβρυο.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει fluazinam. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

**Μηλιά, Αχλάδι, Κυδωνιά, Μουσαμουλιά, Ιαπωνική Μουσαμουλιά:** Για Φουζικιάδω (Venturia inaequalis, Venturia pirina), Αίτερνάρια (Alternaria mali, Alternaria alternata) με δόσεις 100 κ.εκ.σκ./στρ. ή 70-100 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρ. Όγκ.ψεκ. υγρ.: 100-150 λίτ./στρ. Από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι τη δεύτερη καρπώπωση ΒΒCH 57-73. Μέχρι 3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Αχλάδι:** Για Στεμφύλιο (Stemphylium Vesicarium) με δόσεις 100 κ.εκ.σκ./στρ. ή 70-100 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρ. Όγκ.ψεκ.υγρ.: 100-150 λίτ./στρ. Από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι τη δεύτερη καρπώπωση ΒΒCH 57-73. Μέχρι 3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Αμπέλι (μόνο ονοποισίμες ποικιλίες σταφυλιών):** Για Τεφρά σήψη (Botrytis cinerea) και Περονόσπορο (Plasmopara viticola) με δόσεις 100-150 κ.εκ.σκ./στρ. ή 100-150 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρ. Όγκ.ψεκ.υγρ.: 20-100 λίτ./στρ. Από την αρχή της άνθησης μέχρι την ωρίμαση των ραγών ΒΒCH 60-85. **Μια (1) εφαρμογή ανά καλλιερητική περίοδο. Πατάτα:** Για Περονόσπορο (Phytophthora infestans) με δόσεις 30-40 κ.εκ.σκ./στρ. ή 30-66 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρ. Όγκ.ψεκ. υγρ.: 60-100 λίτ./στρ. Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων μέχρι την έναρξη του κτηνιόματος των φύλλων ΒΒCH 10-91. Μέχρι 10 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.

**Παρατηρήσεις:** 1. Η δόση είναι ανάλογη της έντασης της προσβολής. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης προσβολής να εφαρμοστεί η μεγάλη δόση με το μικρό μεσοδιάστημα. 2. Να ρυθμιστεί τη δόση ανά εκατόλιτρο ώστε να μην υπερβαίνει τη μέγιστη δόση ανά στρέμμα. 3. Η χρήση στην Αχλάδι περιλαμβάνει και την Αχλάδομηλιά (PYUPC).

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Μηλιά, Αχλάδι, Κυδωνιά, Μουσαμουλιά, Ιαπωνικά Μούσαμουρα, Αχλάδι-Αχλαδόμηλιά: 60 ημέρες, Αμπέλι (μόνο ονοποισίμες ποικιλίες σταφυλιών): 21 ημέρες, Πατάτα: 7 ημέρες.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fluazinam, η οποία ανήκει στην ομάδα 29 κατά FRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** • Να μην εισέρχεται μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα. • Στο αμπέλι, μην εκτελέσει χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. αποψήληση) πριν περάσουν 17 ημέρες από την τελευταία εφαρμογή. Μετά την πάροδο 17 ημερών μπορείτε να εκτελέσετε χειρωνακτικές εργασίες φροντίδας οδώσιμης φόρμας εργασίας και γάντια. • Στα μηλίαιδα μην εκτελέσει χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. αραίωμα καρπών) πριν περάσουν 5 ημέρες από την τελευταία εφαρμογή. Μετά την πάροδο 5 ημερών μπορείτε να εκτελέσετε χειρωνακτικές εργασίες φροντίδας οδώσιμης φόρμας εργασίας και γάντια.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορριπτακό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τριψύμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** ---

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:** Να αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλειστή συσκευασία του σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και μακριά από άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.