ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: *•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. •Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. •Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την ανάμιξη/φόρτωση/εφαρμογή/επανείσοδο στην καλλιέργεια.*

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση εισπνοής: *Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.* ***Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:*** *Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάπτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.* ***Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:*** *Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.* ***Σε περίπτωση κατάποσης:*** *Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.*
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: *Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.*
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Μη μολύνετε τα νερά με το προϊόν ή την συσκευασία του.
Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους τηρείτε από τις γειτονικές καλλιέργειες:
*• μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** ή μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων** μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50 %** ή μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **1 μέτρου σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων** μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90 %** όταν κάνετε μια εφαρμογή (80-120 κ.εκ./στρ.).*
*•μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** ή μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **1 μέτρου σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων** μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75 %** όταν κάνετε σπαστή εφαρμογή (2x60κ.εκ./στρ.).*
Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών τηρείτε από τα επιφανειακά ύδατα:
*• μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων** μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50 %**, όταν κάνετε μια εφαρμογή (120 κ.εκ./στρέμμα) ή όταν κάνετε σπαστή εφαρμογή (2x60 κ.εκ./στρ.)*
*• μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** ή χρησιμοποιήστε **ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται 50 %** μείωση διασποράς του ψεκαστικού νέφους, όταν κάνετε μια εφαρμογή (80 κ.εκ./στρ.).*

Κατηγορία και τρόπος δράσης: *Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων του αραβόσιτου. Το nicosulfuron δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο συνθέταση του οξειγαλακτικού (ALS) και απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες ενώ το dicamba δρα αναστέλλοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων και απορροφάται από το φύλλωμα, ρίζες και βλαστούς.*

Τρόπος εφαρμογής: *Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με 10-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μέχρι 3 ατμόσφαιρες.*

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: *Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.*

Φάσμα δράσης: Αραβόσιτος: *κατά των ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων*, με δόση 80-120 κ.εκ.ακ./στρέμμα (max) και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα. Μία (1)** εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος από το 2ο έως το 8ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 12-18).*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: *1. Σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άργιλο < 10%, να εφαρμόζετε τη μικρή δόση (80 κ.εκ./ στρέμμα). 2. Σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άργιλο > 10% να εφαρμόζετε: i) 1 εφαρμογή εύρους 80-120 κ.εκ./στρέμμα. Οι μικρές δόσεις να εφαρμόζονται για την καταπολέμηση των ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης και οι μεγάλες δόσεις σε δύσκολες συνθήκες όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός ζιζανίων ή τα ζιζάνια βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης ή ii) **σπαστή εφαρμογή δηλαδή **2 εφαρμογές σε μεσοδιάστημα 7-15** ημέρες, ως εξής: •1η εφαρμογή με δόση 80 κ.εκ/στρ. και 2η εφαρμογή με δόση 40 κ.εκ/στρ. ή •2 εφαρμογές των 60 κ.εκ./στρ. 3. Η μέγιστη αθροιστικά δόση ανά καλλιεργητική περίοδο να μην υπερβαίνει τα 120 κ.εκ./στρ.*

Αρ. Παρτίδας/
Ημερ. Παραγωγής:
Βλέπε συσκευασία

L1152026 GREC/04E PPE4253283

Milagro® Plus

syngenta

GROUP 4 2 HERBICIDES

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Dicamba (ομάδα Βενζοϊκών παραγώγων)
Nicosulfuron (ομάδα Σουλφονυλουριών)

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70280/03.04.2018

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Dicamba 22 % β/ο
Nicosulfuron 5 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 71,38 % β/β

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων του αραβόσιτου.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: Βι.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

- ***Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.***
- ***Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.***
- ***Μπορεί να προκαλέσει πολύ μακροχρόνια και διάχυτη μόλυνση των υδάτινων πόρων.***

1 lt e

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

** **Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Δόση: 80-120 κ.εκ. /στρ.: Ευαίσθητα ζιζάνια:** Βέλπουρας (Sorghum halepense) {σπόρος }, Βλίτο τραχύ (Amaranthus retroflexus), Γλυστρίδα (Portulaca oleracea), Κεχρί (Panicum dichotomiflorum), Λουβουδιά (Chenopodium album), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Τάτουλας (Datura stramonium).*
Μετρίως ευαίσθητα: *Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), Σετάρια (Setaria pumila).*
Δόση 80 κ.εκ./στρέμμα: Μετρίως ευαίσθητα: *Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti), Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), Βέλπουρας (Sorghum halepense) {ριζώμα}, Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis)*
Δόση 120 κ.εκ./στρέμμα: Ευαίσθητα ζιζάνια: *Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti), Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), Βέλπουρας (Sorghum halepense) {ριζώμα}, Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis)*
Σπαστή Δόση: 80+ 40 κ.εκ./στρ.: Ευαίσθητα ζιζάνια: *Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti), Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), Βέλπουρας (Sorghum halepense) {σπόροςβρίζωμα}, Βλίτο τραχύ (Amaranthus retroflexus), Λουβουδιά (Chenopodium album), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis), Σετάρια (Setaria pumila), Τάτουλας (Datura stramonium). **Μετρίως ευαίσθητα:*** *Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)*
Σπαστή Δόση 2x60 κ.εκ./στρ.: Ευαίσθητα ζιζάνια: *Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), Βέλπουρας (Sorghum halepense) {σπόροςβρίζωμα}, Βλίτο τραχύ (Amaranthus retroflexus), Λουβουδιά (Chenopodium album), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis), Σετάρια (Setaria pumila), Τάτουλας (Datura stramonium). **Μετρίως ευαίσθητα:*** *Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)*

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αραβόσιτος: *Δεν ορίζεται*

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: *1. Να μην εφαρμόζεται σε περίπτωση που το καλαμπόκι βρίσκεται σε κατάσταση stress. 2. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεταξύ των 25°C και 15°C και με υγρασία μεγαλύτερη από 60%. 3. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργεια αραβόσιτου που προορίζεται για σποροπαραγωγή και σε γλυκό καλαμπόκι. 4. Να μην εφαρμόζεται εάν έχει προηγηθεί εφαρμογή κοκκώδους οργανοφωσφωρικού ή καρβαμιδικού εντομοκτόνου κατά την σπορά. 5. Η εφαρμογή του να απέχει τουλάχιστον μία εβδομάδα από τον ψεκασμό φυλλώματος με οργανοφωσφωρικό ή καρβαμιδικό εντομοκτόνο. 6. Να μην εφαρμόζεται σε εναλλαγή ή σε συνδυασμό με προϊόντα που περιέχουν σουλφονυλουρία.****Για να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ακολουθείτε τις παρακάτω γεωργικές πρακτικές:*** *•Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ). •Να γίνεται εναλλαγή καλλιεργειών. •Να χρησιμοποιείτε την προτεινόμενη δόση και χρόνο εφαρμογής για τον έλεγχο των δυσκολότερων ζιζανίων που βρίσκονται στο χωράφι. •Να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.*

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και •σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:*Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορεί να σπαρθεί αραβόσιτος, αφού προηγηθεί βαθιά άροση (20 εκ.). **•σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:*** *Το φθινόπωρο μπορούν να σπαρθούν χειμερινό σιτάρι ή ελληνικοράμβη και την επόμενη άνοιξη (1 έτος μετά την εφαρμογή του MILAGRO PLUS) σόργο, ζαχαρότευτλα, ηλίανθος ακολουθεί προηγηθεί βαθιά άροση (20 εκ.). **•της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:*** *Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.*

Φυτοτοξικότητα: *Είναι πιθανό να εμφανισθούν συμπτώματα φυτοτοξικότητας όπως χλώρωση, αποχρωματισμός, παραμόρφωση ή νανισμός, τα οποία όμως είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν την απόδοση της καλλιέργειας.*

Συνδυαστικότητα: ---

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: *Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος 3% (1 λίτρο ανά εκατόλιτρο) μέχρις ότου απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του σκευάσματος.*
Τα στάδια καθαρισμού τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής: 1. Αδειάστε τελείως το βυτίο. Οποιαδήποτε μόλυνση στο εξωτερικό του εξοπλισμού ψεκασμού, πρέπει να αφαιρεθεί με πλύσιμο με καθαρό νερό. 2. Γεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (ανάλβα, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε το ξανά. 3. Γεμίστε το ¼ του βυτίου με καθαρό νερό και προσθέστε 1 λίτρο αμμωνίας οικιακής χρήσης 3% ανά 100 λίτρα νερό. Αναδεύστε και κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό στα μπεκ και τους σωλήνες. Αφήστε το διάλυμα να δράσει αναδεύοντας για 15 λεπτά και στη συνέχεια αδειάστε το βυτίο. 4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3. 5. Χρησιμοποιείστε το ίδιο διάλυμα για να ξεπλύνετε τα φίλτρα και τα μπεκ.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: *Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται από πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό(και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.*

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: *Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία άνω των 35°C.*

L1152026 GREC/04E PPE4253283