



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26 - 4 - 2016
Αριθ.πρωτ: 4455/51004

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 9287230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas
Τ.Κ.1 5349
e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Α.Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) MATCH 5 EC (δ.ο. lufenuron)
Β.Ανάκληση της με αριθ. 1691 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) MATCH 5 EC (δ.ο. lufenuron)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 32 και 80.5 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία lufenuron.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
8. Την έκθεση αξιολόγησης και έγκριση της Πορτογαλίας (No 0658)
9. Την υπ' αριθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015), με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων"
10. Τη με αριθ. πρωτ. 7203/73240/29-6-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MATCH** της εταιρείας **Syngenta Hellas AEBE**, με τα ακόλουθα στοιχεία :

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

14563
26/4/2016
31/12/2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

MATCH 5 EC
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ζών ουσίας/ών κατά ISO
- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Lufenuron

97% min

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετίας
--

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Syngenta Crop Protection Monthey S.A. Route del'Île au Bois CH-1870 Monthey Ελβετίας
--

3

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας lufenuron όπως υποβάλλονται με τα έγγραφα για τη συμμόρφωση μετά την καταχώρηση της δ.ο.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Syngenta Hellas AEBE
ΑΜΕ:
Τ.Κ.15349
Τηλ.:210-6666612-13
Fax:210 6665777
E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG Ελβετίας
CH - 4002 Basel, Switzerland

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1. Schirm GmbH Sideco.
Mecklenburger Strasse 229
D-23568 Lübeck
Γερμανία
2. Chemark Kft, H-8182 , Peremarton gyartelo
, Industrial zone, Ουγγαρία
3. Syngenta South Africa (Pty) Limited Brits
Production
Brits Production 4 Krokodil drift Road
Brits 0250 Νότια Αφρική
4. Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
Rodovia SP 332 KM 130
CEP 13140-000
Paulinia, SP
Βραζιλία

4

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Syngenta Hellas AEBE
Οινόφυτα-Βοιωτίας
2. Schirm GmbH Sideco.
Mecklenburger Strasse 229
D-23568 Lübeck
Γερμανία
3. Chemark Kft, H-8182 , Peremarton gyartelep
Industrial zone, Ουγγαρία
4. Syngenta South Africa (Pty) Limited Brits
Production
Brits Production 4 Krokodilrift Road
Brits 0250 Νότια Αφρική
5. Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
Rodovia SP 332 KM 130
CEP 13140-000
Paulinia, SP
Βραζιλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Lufenuron 5% (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 95.43 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει κατατεθεί στο φάκελο της έγκρισης του προϊόντος.

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιαλίδια εντός χαρτοκιβωτίου	200, 250 και 300 κ.εκ.	f-HDPE, HDPE HDPE/PA, HDPE/EVOH PET
2	Φιάλες	200 κ.εκ, 250 κ.εκ, 300 κ.εκ., 400 κ.εκ., 500 κ.εκ. και 1 λίτρου.	f-HDPE, HDPE HDPE/PA, HDPE/EVOH PET
3	Δοχείο ή μπιτόνι	1 λίτρο, 5 λίτρων	f-HDPE, HDPE HDPE/PA, HDPE/EVOH PET

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια, φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα και τα κουτιά με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το **MATCH 5 EC** είναι μη-διασυστηματικό εντομοκτόνο, το οποίο δρα από στομάχου ενώ έχει και ασθενή δράση από επαφής. Περιέχει την δραστική ουσία lufenuron που είναι παρεμποδιστής βιοσύνθεσης χιτίνης και έτσι επιδρά στην έκδυση (μεταμόρφωση) των προνυμφών προκαλώντας το θάνατό τους. Έχει επίσης ωοκτόνο δράση.

5 5.1 Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρό	Όγκος ψεκαστικού υγρού Λίτρα/ στρέμμα	Μέγιστη Δόση κ.εκ/ στρέμμα		
Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκυθάκι (Θ)	Πράσινο σκουλίκι <i>Helicoverpa armigera</i>	100	50-100	100	Οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς με την εμφάνιση της προσβολής	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών εφόσον απαιτείται
	Σποντόπτερα <i>Sprodoptera sp</i>					
	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips tabaci</i>	200		200		
Ανθοκομικά (θερμοκη-πίου) Καλλωπιστικά άνθη (Χρυσάνθεμο, μαργαρίτα, ζέρμπερα, γαρύφαλλο), καλλωπιστικά γλαστρικά (αφρικανική βιολέτα, κυκλάμινο, διεφενμπάχια, πελαργόνιο, βερβένα), καλλωπιστικοίθάμνοι (βιβούρνο) και τριαντάφυλλα.	Πράσινο σκουλίκι <i>Helicoverpa armigera</i>	100	50- 100	100	Οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς με την εμφάνιση της προσβολής	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-25 ημερών εφόσον απαιτείται
	Σποντόπτερα <i>Sprodoptera sp</i>					
	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i>	200		200		

Οι ακόλουθες χρήσεις θα χορηγηθούν μετά τον καθορισμό κοινοτικών Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων σύμφωνα με το παρακάτω φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρ ό	Όγκος ψεκαστικού υγρού Λίτρα/ στρέμμα	Μέγιστη Δόση κ.εκ/ στρέμμα		
Μελιτζάνα (θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp</i>	100	50-100	100	Οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς με την εμφάνιση της προσβολής	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών
	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips tabaci</i>	200		200		
Κολοκύθα Πεπόνι Καρπούζι (θερμοκηπίου)	Θρίπας <i>Helicoverpa armigera</i> Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp</i>	100	50-100	100		
	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i>	200		200		
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μελιτζάνα (θερμοκηπίου): 7 ημέρες Κολοκύθα, πεπόνι, καρπούζι (θερμοκηπίου): 3 ημέρες						

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	<ul style="list-style-type: none"> - Για να προστατευθούν τα έντομα επικονιαστές στο θερμοκήπιο, πρέπει να απομακρύνονται πριν την εφαρμογή και να παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής για τις επόμενες 48 ώρες. - Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συστήνεται εναλλαγή χρήσης με εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. - Αριθμός εφαρμογών: όπως αναφέρονται στο φάσμα δράσης.
--	--

8

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Η είσοδος επιτρέπεται όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό διάλυμα στις φυλλικές επιφάνειες των καλλιεργειών.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής πλην των ανθοκομικών φυτών στα οποία συνίσταται να γίνεται μία δοκιμή, σε μικρή κλίμακα, για την αποφυγή εμφάνισης συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας σε κάποιες ευαίσθητες ποικιλίες.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS07
Προσοχή

GHS09

- 10** Φράσεις κινδύνου

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11 Φράσεις
προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς /εκνεφώματα.

P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια.

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

«Αερίστε το χώρο του θερμοκηπίου μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα που εφαρμόσατε, προτού ξαναμπείτε σε αυτόν».

P362+P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε

“Οι χειριστές να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη-φόρτωση και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος”

“Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια σε περίπτωση που εισέλθουν στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό”

SP1 Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο**Πρώτες βοήθειες**

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη ,την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για 15 λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.

Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Αναζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε /Επισκεφτείτε γιατρό

Αναπνοή: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

13

13.1 Για τις καλλιέργειες της μελιτζάνας και τα κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό,, δεν έχουν καθοριστεί προς το παρόν από την Επιτροπή, Κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική))¹

3.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα, πιπεριά, αγγούρι, κολοκυθάκι (θερμοκηπίου)	7
Ανθοκομικά (θερμοκηπίου)	Μη εφαρμοσίμο

14

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος².

Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από ήλιο και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο.

15**Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

¹ Ορίζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται εθνικά ή κοινοτικά MRLs ή τα υφιστάμενα δεν ικανοποιούν την εγκρινόμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική. Στις περιπτώσεις που έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs αναγράφεται η φράση: «Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs».

² Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι μικρότερη των δύο (2) ετών

Β Ανακαλούμε από την υπογραφή της παρούσας (26-4-2016) τη με αριθ. 1691 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος) MATCH 5 EC (δ.ο. lufenuron).

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις μήνες (έως τις 26-7-2016).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 26-10-2016).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 26-10-2017).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 26-10-2017, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Γ Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ