



Celest[®]

025 FS

syngenta[®]

Fludioxonil (χημική ομάδα φαινυλοπυρρολίων)

Πυκνό εναιώρημα για επένδυση σπόρων (FS)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.:
60385/20-09-2013

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

fludioxonil 2.5 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες 97,5% β/β

Προληπτικό μυκητοκτόνο επαφής για επένδυση σπόρων.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.

Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13

www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3



- **Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

20 lt e

TM



Celest[®]

025 FS

syngenta[®]

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα ή το δευτείο δεδομένων ασφαλείας όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκουραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλύνετε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείτε.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης:

Προληπτικό μυκητοκτόνο επαφής για επένδυση σπόρων που περιέχει fludioxonil. Το fludioxonil (χημική ομάδα φαινόλυπουροφών) προκαλεί βλάβες στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων και παρεμποδίζει την ανάπτυξη του μυκηλίου.

Τρόπος εφαρμογής:

Το CELEST 025FS, εφαρμόζεται σαν υδατική βάση ποτίστος (slurry) χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα εφαρμογής και τα οποία εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κάλυψη των σπόρων. Ανισομόμορφη ή μη πλήρης κάλυψη είναι πιθανόν να μην δώσει τον αναμενόμενο έλεγχο των καταπορευόμενων ασθενειών. Να γίνεται πολύ προσεκτικά ανάμειξη της προτεινόμενης, κάθε φορά, ποσότητας του CELEST 025FS, με το απαιτούμενο νερό. Να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης του μηχανήματος επένδυσης των σπόρων. Το CELEST 025FS εφαρμόζεται στους σπόρους διαλυμένο σε νερό με την μεθοδό της υγρής εφαρμογής χρησιμοποιώντας όγκο νερού 500 - 1000 κ. εκ. ανά 100 κιλά σπόρου.

Αρ. Παρτίδας:

Ημ/νία Παραγωγής:

Product names marked © or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

20 lt e

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο βυτίο εφαρμογής) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριπήνη, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια εάν διατηρηθεί στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Σιτάρι, Σίκαλη, Κριθάρι, Τριτικάλη, Ηλιάνθος: Μη εφαρμοζόμενο

Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιέργητική περίοδο
		κ.εκ./100 κιλά σπόρου	Όγκος νερού για τη μέθοδο slurry κ.εκ./100 κιλά σπόρου		
Σιτάρι	Φουζάριο <i>Microdochium nivale</i> , <i>Fusarium sp.</i> , Σεπτορίαση <i>Septoria nodorum</i> Δαυητές <i>Tilletia caries</i>	200	500-1000	Επένδυση σπόρων	Μία εφαρμογή
Κριθάρι	Φουζάριο <i>Fusarium sp.</i> , Ελμινθοσπορίαση <i>Helminthosporium gramineum</i>	200	500-1000	Επένδυση σπόρων	Μία εφαρμογή
Σίκαλη	Φουζάριο <i>Microdochium nivale</i> <i>Fusarium sp.</i>	200	500-1000	Επένδυση σπόρων	Μία εφαρμογή
Τριτικάλη	Φουζάριο <i>Microdochium nivale</i> <i>Fusarium sp.</i>	200	500-1000	Επένδυση σπόρων	Μία εφαρμογή
Ηλιάνθος	Βοτρυτίτις <i>Botrytis cinerea</i>	600 100δύναμο με 45 ml/ 150.000 σπόρου	500-1000	Επένδυση σπόρων	Μία εφαρμογή

