

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμώσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Αερίστε το χώρο του θερμοκηπίου μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα που εφαρμόσατε, προτού ξαναμπείτε σε αυτόν. • Βγάλτε τα φορεσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • Οι χειριστές να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη-φόρτωση και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος. • Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια σε περίπτωση που εισέλθουν στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για 15 λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Αναζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείτε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξεπλυμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το MATCH 5 EC είναι μη-διασυστηματικό εντομοκτόνο, το οποίο δρα από στομάχου ενώ έχει και ασθενή δράση από επαφή. Περιέχει την δραστική ουσία lufenuron που είναι παρεμποδιστής βιοσύνθεσης χιτίνης και έτσι επιδρά στην έκδυση (μεταμόρφωση) των προνυμφών προκαλώντας το θάνατό τους. Έχει επίσης ωοκτόνο δράση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Οδηγία για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια, φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα και τα κομμάτια με σκόμιο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

L1041313 GREC/3W PPE4093658

 **Match**[®]
5 EC

syngenta[®]

Lufenuron

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 14563/26-4-2016

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Lufenuron 5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 95,43% β/β

**Μη-διασυστηματικό
εντομοκτόνο με δράση
από στομάχου και ασθενή
δράση δι' επαφής.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

**Προορίζεται μόνο για
επαγγελματίες χρήστες.**

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49

Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3



1 l t e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

ΠΡΟΣΟΧΗ



- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Φάσμα δράσης:

Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Θ), Κοκοκυθάκι (Θ): α) Για Πράσινο ακουλήκη (Helicoverpa armigera) και για Σποντόπτερα (Spodoptera sp.): 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 κ.εκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. β) Για Θρίπια (Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci): 200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 200 κ.εκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός/ τρόπος & χρόνος εφαρμογών: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών εφόσον απαιτείται για τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά και 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών εφόσον απαιτείται για αγγούρι, κοκοκυθάκι. Οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς με την εμφάνιση της προσβολής.

Κοκοκύθα (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ): α) Για Πράσινο ακουλήκη (Helicoverpa armigera) και για Σποντόπτερα (Spodoptera sp.): 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 κ.εκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. β) Για Θρίπια (Frankliniella occidentalis): 200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 200 κ.εκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός/ τρόπος & χρόνος εφαρμογών: 2-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών. Οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς με την εμφάνιση της προσβολής.

Ανθοκομικά (θερμοκηπίου), καλλιπωστικά άνθη (χρυσάνθεμο, μαργαρίτα, ζυμυρεα, γαρύφαλλο), καλλιπωστικά γλαστρικά (αφρικανική βιολέτα, κηκλάμινο, διεφενμπάκια, πελαργόνιο, βερβένα), καλλιπωστικοί θάμνοι (βιβούρνο) και τριαντάφυλλα: α) Για Πράσινο ακουλήκη (Helicoverpa armigera) και για Σποντόπτερα (Spodoptera sp.): 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 κ.εκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. β) Για Θρίπια (Frankliniella occidentalis): 200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 200 κ.εκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός/ τρόπος & χρόνος εφαρμογών: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-25 ημερών εφόσον απαιτείται. Οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς με την εμφάνιση της προσβολής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Τομάτα (Θ), μελιτζάνα (Θ), πιπεριά (Θ), αγγούρι (Θ), κοκοκυθάκι (Θ): 7 ημέρες. Κοκοκύθα (Θ), πεπόνι (Θ), καρπούζι (Θ): 3 ημέρες. Ανθοκομικά (θερμοκηπίου): μη εφαρμοσίμο.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Για να προστατευθούν τα έντομα επικονιαστές στο θερμοκήπιο, πρέπει να απομακρύνονται πριν την εφαρμογή και να παραμείνουν εκτός τους πεδίου εφαρμογής για τις επόμενες 48 ώρες. • Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συστήνεται εναλλαγή χρήσης με εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. • Αριθμός εφαρμογών: όπως αναφέρονται στο φάσμα δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Η είσοδος επιτρέπεται όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό διάλυμα στις φυλλώδεις επιφάνειες των καλλιεργειών.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής πλην των ανθοκομικών φυτών στα οποία συνιστάται να γίνεται μία δοκιμή, σε μικρή κλίμακα, για την αποφυγή εμφάνισης συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας σε κάποιες ευαίσθητες ποικιλίες.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από ήλιο και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο.